

9.9.2004

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit vuonna 2003

Aborter och steriliseringar 2003
Induced abortions and sterilisations 2003

Raskaudenkeskeytykset

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

sähköposti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi
Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459


www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Stakes julkaisi ennakkotiedot vuoden 2003 raskaudenkeskeyksistä huhtikuussa 2004. Lopullisten tilastojen mukaan vuonna 2003 raskaudenkeskeyksiä tehtiin 10 709 eli 9,0 tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Keskeytykset vähenivät noin 200 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 1973 jälkeen keskeytykset vähenivät vuoteen 1995 asti sekä absoluuttisesti että suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin. Vuonna 1995 keskeytyksien määrä jäi alle kymmenentuhannen, mutta tämän jälkeen keskeytyksiä on ollut vuosittain 10 000 – 11 000.

Eniten raskaudenkeskeyksiä tehdään 20–24-vuotiaalle (25 % kaikista keskeyksistä vuonna 2003). Alle 20-vuotiaiden keskeytykset ovat hieman vähentyneet, noin 6 % verrattuna vuoteen 2002. Suurin osa keskeyksistä tehdään sosiaalisin perustein eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi (86,8 % vuonna 2003). Sosiaaliset syyt raskaudenkeskeyksien perustena ovat yleistyneet muiden syiden vähentyessä. Muut yleisimmät perusteet ovat alle 17 vuoden ikä (6,7 %), yli 40 vuoden ikä (3,6 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,0 %). Lääketieteellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinväistä tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,5 prosenttia keskeyksistä. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi suoritettuja keskeyksiä oli 2,3 % kaikista keskeyksistä.

Kuvio 1: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan (viikkona) 1998–2003



Asuinkunnan mukaan tarkasteltuna eniten keskeytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin tehtiin Ahvenanmaalla (11,9/1000) ja Helsingissä (11,5/1000) vuonna 2003. Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Savossa (alle 7/1000).

Lääkkeellisen keskeytyksen yleistyessä (33 % vuonna 2003) jo ennen 6. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus on lisääntynyt (35,9 % vuonna 2003.) Suurin osa keskeytyksistä tehdään ennen 12. raskausviikkoa (93,8 % vuonna 2003). 31,7 % keskeyttäneistä oli vähintään yksi aikaisempi keskeytys ja 47,3 % vähintään yksi aikaisempi synnytys. 64,5 % oli käyttänyt jotaan ehkäisymenetelmää raskauden alkaessa ja 2,3 % oli käyttänyt jälkiehkäisyä. Jälkiehkäisyä käyttäneiden raskaudenkeskeyttäjien määrä on lisääntynyt sen saatua reseptipäiden keväällä 2001.

Steriloinnit

Naisten steriloointeja tehtiin 5 883 ja miesten steriloointeja 1 637 vuonna 2003. Naisten steriloinnit vähenivät noin 12 %, mutta miesten steriloinnit lisääntyivät noin 3 %. Yhteensä steriloinnit vähenivät verrattuna edelliseen vuoteen noin 9 %. Vuoden 1985 lainmuutoksen jälkeen naisten steriloinnit yleistyvät nopeasti ja niiden määrä oli suurimmillaan vuosina 1987, 1989–1992 ja 1996, jolloin tehtiin yli 12 000 steriloointia. Miesten huippuluku 2202 saavutettiin vuonna 1997.

Steriloinneista 78,2 % tehtiin naisille ja 21,8 % miehille vuonna 2003. Yleisin steriloinnin peruste on ollut vähintään 30 vuoden ikä sekä miehillä (76 % vuonna 2003) että naisilla (65 %). Väestöön suhteutettuna vuonna 2003 tehtiin 3,4 steriloointia tuhatta 25–54-vuotiasta kohti, naisille merkittävästi enemmän (5,5/1000) kuin miehille (1,5/1000).

Väkilukuun suhteutettuna eniten steriloointeja tehtiin Lapin sairaanhoitopiirissä (6,5/1000) ja vähiten Helsingissä (1,2/1000). Miesten steriloointeja tehtiin eniten Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (2,8/1000) ja vähiten Ahvenanmaalla (0,0/1000). Naisten steriloointeja tehtiin eniten Lapin sairaanhoitopiirissä (12,1/1000) ja vähiten taas Helsingissä (1,8/1000).

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2003

Taulukko 2: Raskaudenkeskeykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2003

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2003

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeykset keskeytysperusteen mukaan 2003

Taulukko 5: Raskaudenkeskeykset raskauden keston mukaan 1985–2003

Taulukko 6: Raskaudenkeskeykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2003

Taulukko 7: Raskaudenkeskeykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2003

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989–2003

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten metodit 1998–2003

Taulukko 10: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951–2003

Taulukko 11: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2003

Taulukko 12: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2003

Taulukko 13: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2003

Taulukko 14: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2003

Taulukko 15: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2003

Lähteet

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisiä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970 ja Steriloimislaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkärin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935–1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955–1970; Terveydenhuolto vuosina 1971–1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin tietokannassa. Vuosien 1987–2001 aineisto on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin tilastoihin mukaan ottamattomia tapauksia, myöhemmin ilmoitettuja on tallennettu. Tämän vuoksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista.

Ikäryhmässä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986–1993 tiedot käytämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä syn-nytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjakamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

9.9.2004

Aborter och steriliseringar 2003

Aborter

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

e-post:
förfannm.släktnamn@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Stakes publicerade i april 2004 preliminära uppgifter om aborter som utförts under 2003. Enligt de slutgiltiga statistikuppgifterna verkställdes 2003 sammanlagt 10 709 aborter, dvs. 9,0 per 1 000 fertila kvinnor. Detta innebär cirka 200 färre aborter än året innan. Efter 1973 minskade antalet aborter fram till 1995 såväl absolut som i relation till antalet fertila kvinnor. År 1995 understeg antalet aborter 10 000, men därefter har antalet varierat mellan 10 000 och 11 000 per år.

Flest aborter utfördes i åldersgruppen 20–24 år (25 procent av alla aborter 2003). Bland kvinnor under 20 år minskade antalet aborter lite, cirka 6 procent jämfört med 2002. Största delen av aborterna utfördes på social indikation, dvs. på grund av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden och andra omständigheter (86,8 procent 2003). De sociala indikationerna ökade medan de övriga indikationerna minskade. De övriga mest frekventa indikationerna var ålder under 17 år (6,7 procent), över 40 år (3,6 procent) och fyra tidigare förlossningar (2,0 procent). På medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslyste eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa, utfördes 0,5 procent av aborterna. Av alla aborter verkställdes 2,3 procent på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health


Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Diagram 1: Aborter efter gestationslängd (veckor) 1998–2003



Om man utgår från hemkommunen, utfördes flest aborter i förhållande till antalet fertila kvinnor på Åland (11,9/1 000) och i Helsingfors (11,5/1 000) år 2003. Antalet aborter var minst i Södra Österbotten och Östra Savolax (under 7/1 000).

Genom att de medicinska aborterna blivit vanligare (33 procent 2003) ökade andelen aborter som gjorts före den sjätte graviditetsveckan (35,9 procent 2003). Största delen av aborterna gjordes före den 12:e graviditetsveckan (93,8 procent 2003). Av abortpatienterna hade 31,7 procent genomgått minst ett tidigare abortingrepp och 47,3 procent hade fött minst ett barn. Av abortpatienterna uppgav 64,5 procent att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod och 2,3 procent hade använt akut p-piller. Antalet abortpatienter som använt akut p-piller har ökat efter att det blev receptfritt våren 2001.

Steriliseringar

År 2003 steriliseras 5 883 kvinnor och 1 637 män. Steriliseringarna av kvinnor minskade med cirka 12 procent, medan steriliseringarna av män ökade med ungefär 3 procent. Sammanlagt minskade antalet steriliseringar med cirka 9 procent jämfört med året innan. Efter lagändringen 1985 blev steriliseringar av kvinnor snabbt allmänna och deras antal var som störst under åren 1987, 1989–1992 och 1996, då man utförde över 12 000 steriliseringar. Rekordantalet för män, 2 202 steriliseringar, nåddes 1997.

Av steriliseringarna gjordes 78,2 procent på kvinnor och 21,8 procent på män år 2003. Den vanligaste steriliseringssindikationen var både för män (76 procent 2003) och kvinnor (65 procent) minst 30 års ålder. År 2003 utfördes i relation till befolkningen 3,4 steriliseringar per 1 000 personer i åldern 25–54 år, avsevärt mer av kvinnor (5,5/1 000) än av män (1,5/1 000).

I relation till befolkningsmängden gjordes flest steriliseringar i Lapplands sjukvårddistrikt (6,5/1 000) och minst i Helsingfors (1,2/1 000). Mest steriliseras män i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (2,8/1 000) och minst på Åland (0,0/1 000). Kvinnor steriliseras mest i Lapplands sjukvårdsdistrikt (12,1/1 000) och minst i Helsingfors (1,8/1 000).

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2003

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2003

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2003

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2003

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2003

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2003

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2003

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2003

Tabell 9: Abortmetoder 1998–2003

Tabell 10: Steriliseringar efter kön 1951–2003

Tabell 11: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2003

Tabell 12: Steriliseringar av kvinnor efter åldersgrupp 1994–2003

Tabell 13: Steriliseringar av män efter åldersgrupp 1994–2003

Tabell 14: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2003

Tabell 15: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2003

Källor

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintölaitos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna från 1987–2001 har granskats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har ingått i statistiken eftersom de har anmälts senare. Därför avviker en del av uppgifterna från den statistik som publicerats tidigare.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

Med **sterilisering** avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.

9.9.2004

Induced abortions and sterilisations 2003

Induced abortions

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

E-mail:
firstname.surname@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459


www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

In April 2004, STAKES published preliminary data on induced abortions in Finland in 2003. According to the final statistics, a total of 10 709 abortions were performed in 2003, representing 9.0 induced abortions per thousand women of fertile age. Compared with the previous year, this represents a decline of some 200 abortions. After 1973 the number of induced abortions declined until 1995, both in absolute terms and in proportion to the number of women of fertile age. In 1995, the total number of induced abortions remained below ten thousand and has since totalled between 10 000 and 11 000 per year.

Most abortions are performed on women aged between 20 and 24 years (25% of all abortions in 2003). Abortions among women under 20 years decreased by some 6% compared with the previous year. Most abortions (86.8% in 2003) are performed on social grounds, meaning that the birth of the child would cause considerable strain to the mother in view of her personal circumstances and living conditions. The proportion of social grounds as the indication of abortion has grown in comparison with other indications. The other most common indication is the patient being under 17 years old (6.7%), over 40 years old (3.6%), or having given birth to four children already (2.0%). Some 0.5% of induced abortions in 2003 were performed on medical grounds, meaning that the pregnancy would endanger the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility. The proportion of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was 2.3% of all abortions.

Figure 1: Induced abortions by gestation length (weeks) 1998–2003



Analysed by the patient's domicile, most abortions in relation to women of fertile age in 2003 were performed in the Åland Islands (11.9/1000) and in Helsinki (11.5/1000). The lowest figures for induced abortions were in Southern Ostrobothnia and Eastern Savo (below 7 per 1000).

As abortions induced by drugs (33% in 2003) have become more common, abortions performed before the 6th week of gestation have increased (35.9% in 2003). Most abortions are performed before the 12th week of gestation (93.8% in 2003). 31.7% of the patients had undergone at least one earlier induced abortion and 47.3% had given birth at least once. Some 64.5% of the abortion patients said that they had used some kind of contraceptive method when the pregnancy started. Post-coital oral contraceptive had been used by 2.3%. The proportion of post-coital oral contraceptive has increased since spring 2001 when the pills became available over the counter.

Sterilisations

In 2003, 5883 women and 1637 men were sterilised. Sterilisations of women declined by some 12%, while the number for men increased by some 3 %. Compared with the previous year, the total number of sterilisations decreased by some 9 %. A marked increase in women's sterilisations occurred after the legislative reform in 1985, peaking in 1987, 1989–1992 and 1996 at over 12 000 sterilisations. Male sterilisations peaked at a total of 2 202 in 1997.

In 2003, 78.2% of the sterilisations were performed on women and 21.8 % on men. The most common indication for sterilisation for both men (76%) and women (65%) has been age of 30 years or over. In terms of the population, 3.4 sterilisations were performed per thousand persons in the 25–54 age group. Significantly more women (5.5 per 1000) than men (1.5 per 1000) were sterilised.

In proportion to the population, most sterilisations were performed in the Lapland Hospital District (6.5 per 1000) and fewest in Helsinki (1.2 per 1000). The number of male sterilisations was the highest in the Hospital Districts of Central Finland (2.8 per 1000) and lowest in the Province of Åland (0.0 per 1000). The number of female sterilisations was the highest in the Lapland Hospital District (12.1 per 1000) and lowest in Helsinki (1.8 per 1000).

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2003

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2003

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2003

Table 4: Induced abortions by indication, 2003

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2003

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2003

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2003

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2003

Table 9: Methods for induced abortion, 1998–2003

Table 10: Sterilisations by sex, 1951–2003

Table 11: Sterilisations by hospital district, 2003

Table 12: Sterilisations by age group among women, 1994–2003

Table 13: Sterilisations among men by age group, 1994–2003

Table 14: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among women, 2003

Table 15: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among men, 2003

Sources

In Finland, the first Act on Induced Abortion entered into force on 1 July 1950 and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion was adopted in 1970.

In accordance with current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970 and Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES pursuant to the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and to section 6 of the subsequent Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. Data for 1987–2001 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding cases that had arrived later and had not previously been included. For these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Terms and definitions

Induced abortion refers to artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2003

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2003

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2003

Vuosi År Year	Keskeytyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntynyt levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	119,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 646	199,7	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 066	166,0	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 373	160,1	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 012	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 422	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 836	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 701	191,8	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 914	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1
2003	10 709	189,7	15,2	16,9	12,2	10,6	8,0	2,9	0,3	9,0

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age=year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2003

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2003

Table 2. Abortions by hospital district and age 2003

Sairaанhoitopiiri ¹ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	17,4	18,7	13,6	11,8	9,4	3,3	0,3	10,2
- Uusimaa - Nyland	15,8	16,8	13,7	11,5	8,7	2,9	0,3	9,3
- Helsinki - Helsingfors	20,4	20,7	13,6	12,3	10,5	4,0	0,2	11,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	16,6	16,4	10,0	10,6	8,1	2,6	0,3	8,9
Satakunta - Satakunta	16,6	17,9	12,5	7,8	7,7	2,3	0,5	8,7
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	14,3	16,2	10,1	10,2	6,8	2,7	0,2	7,9
Pirkanmaa - Birkaland	14,8	15,4	10,6	9,5	9,2	2,9	0,2	8,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	13,4	18,6	17,3	12,8	7,0	2,5	0,3	9,4
Kymenlaakso - Kymmenedalen	16,0	19,1	11,7	11,2	5,8	3,8	0,0	8,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen	10,5	12,9	14,8	6,5	6,9	1,8	0,0	7,0
Etelä-Savo - Södra Savolax	19,5	14,2	11,7	5,8	5,2	2,5	0,0	7,7
Itä-Savo - Östra Savolax	12,2	14,9	12,2	7,6	3,8	1,3	0,0	6,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	12,3	15,4	11,0	9,4	7,0	2,5	0,1	7,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax	16,9	16,5	11,1	11,0	6,1	1,9	0,3	8,5
Keski-Suomi - Mellersta Finland	14,3	16,1	11,3	11,5	6,5	3,0	0,1	8,7
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	9,5	11,3	7,8	9,4	5,5	3,0	0,3	6,3
Vaasa - Vasa	14,2	17,1	10,8	8,7	7,9	2,6	0,3	8,6
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	10,6	13,0	8,6	6,7	8,1	3,9	0,0	7,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	14,8	13,6	10,8	10,4	5,9	2,3	0,4	8,2
Kainuu - Kajanaland	11,9	15,0	12,0	7,5	5,7	3,6	0,3	7,3
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	17,8	20,6	16,8	8,3	11,9	2,5	0,4	10,3
Lappi - Lappland	12,2	20,4	15,7	15,3	7,8	3,2	0,4	9,5
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	13,6	29,8	9,4	16,8	14,7	4,4	1,0	11,9
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	15,2	16,9	12,2	10,6	8,0	2,9	0,3	9,0

1) **Potilaan asuinpaikan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2003, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2003, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970-2003, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteell- linen Medicinsk Social Medical	Sosi- aalinen Social	Eettinen Criminal	Alle 17 v. Under 17 år under 17	Täytännyt Fyllt Age 40 Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Given birth to 4 children	Mahdollinen Möjlig Potential	Todettu Fött 4 foetal defect	Lapsen- sikiövaario fosterskada	Yhteensä hoitokyvyn rajoittu- neisuuks Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Totalt Total
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,3	84,4	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	76,0	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	..	-	100	11 066
1993	0,6	73,7	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	..	0,0	100	10 373
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	..	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	..	0,0	100	10 422
1997	0,3	80,8	0,0	4,4	4,5	2,0	1,9	..	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 836
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 932
2001	0,4	84,8	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 782 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,3	0,1	6,8	3,9	2,1	0,6	1,4	0,0	100	11 103 ⁽⁴⁾
2003	0,5	86,8	0,1	6,7	3,6	2,0	1,0	1,3	0,0	100	10 911 ⁽⁴⁾

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. Under the current law.

2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över totala antalet. Statistics on available total number only.

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.

4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2003

Tabell 4: Utforda aborter efter indikation 2003

Table 4: Abortions by indication 2003

Peruste - Indikation - Indication									
Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä	Lääketiet.	Sosiaalinen	Eettinen	Alle 17 v.	Yli 40 vuotta	4 lasta	Mahdollinen sikiövaario	Todettu sikiövaario	Yhteensä ¹⁾
Civilstånd, ålder och antal förlossningar	Medicinsk Medical	Social	Criminal	Under 17 år Age under 17	Över 40 år Age 40 or more	4 barn 4 children	Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Totalt Total
Marital status, age and number of deliveries									
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status									
Naimisissa - Gift - Married	18	1 738	-	4	192	129	60	88	2 229
Naimaton - Ogift - Single	32	6 715	5	714	99	35	44	50	7 694
Leski - Ånka - Widowed	-	32	1	-	1	-	-	-	34
Eronnut - Frånskild - Divorced	1	804	2	-	92	46	2	4	951
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 292	8	718	384	210	106	142	10 911
Ikä - Ålder - Age²⁾									
-13	-	-	-	13	-	-	-	-	13
14	-	-	1	48	-	-	-	-	49
15	-	1	-	195	-	-	1	-	197
16	-	4	-	380	-	-	-	-	384
17	-	418	-	82	-	-	-	1	501
18	1	601	-	-	-	-	2	2	606
19	3	666	-	-	-	-	1	-	670
20-24	7	2 675	3	-	-	4	8	20	2 717
25-29	11	1 843	1	-	-	27	20	38	1 940
30-34	12	1 543	2	-	-	54	26	27	1 664
35-39	13	1 311	1	-	-	90	26	36	1 477
40-44	1	214	-	-	349	33	19	18	634
45-49	3	16	-	-	35	2	3	-	59
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 292	8	718	384	210	106	142	10 911
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries									
0	18	4 803	4	711	47	-	42	64	5 689
1	11	1 765	1	7	74	-	39	37	1 934
2	17	1 745	3	-	137	1	15	28	1 946
3	4	780	-	-	85	7	6	8	890
4	1	141	-	-	31	142	3	2	320
5	-	45	-	-	7	43	1	-	96
6	-	7	-	-	1	8	-	1	17
7	-	5	-	-	2	6	-	-	13
8	-	1	-	-	-	3	-	-	4
9-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	51	9 292	8	718	384	210	106	142	10 911

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2003

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2003

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2003

Raskauden kesto, viikkoja

Gestationslängd, veckor

Gestation length, weeks

	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-	Tuntematon Yhteensä	
													Okänd	Totalt
													Unknown	Total
1985	1 853	2 597	3 086	2 647	1 987	949	156	216	191	139	7	4	-	13 833
1986	1 947	2 595	2 982	2 459	1 784	869	134	192	156	175	13	13	-	13 319
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 798	858	144	221	152	157	17	16	4	12 646
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	-	11 737
1992	1 917	2 212	2 374	1 987	1 340	627	136	168	133	126	33	13	-	11 066
1993	1 877	2 118	2 306	1 808	1 158	550	129	159	133	102	24	9	-	10 373
1994	1 988	2 107	2 140	1 615	1 096	461	114	177	135	124	34	21	-	10 012
1995	1 888	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	-	9 872
1996	2 019	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 422
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	1	10 250
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 075	459	184	161	125	113	27	13	3	10 751
1999	2 321	2 448	2 318	1 550	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 836
2000	2 605	2 372	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	-	10 932
2001	3 553	2 290	1 726	1 213	915	357	179	179	145	101	30	13	-	10 701
2002	3 777	2 398	1 697	1 097	877	382	226	181	129	105	32	13	-	10 914
2003	3 842	2 460	1 624	958	781	377	190	178	139	96	41	22	1	10 709
	%													
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	-	100
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	-	100
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	-	100
1992	17,3	20,0	21,5	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	-	100
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	-	100
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	-	100
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	-	100
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	-	100
2001	33,2	21,4	16,1	11,3	8,6	3,3	1,7	1,7	1,4	0,9	0,3	0,1	-	100
2002	34,6	22,0	15,5	10,1	8,0	3,5	2,1	1,7	1,2	1,0	0,3	0,1	-	100
2003	35,9	23,0	15,2	8,9	7,3	3,5	1,8	1,7	1,3	0,9	0,4	0,2	0,0	100

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2003

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2003

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2003

Aikaisemmat synnytykset

Tidigare förlossningar

Previous deliveries

	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd <i>Unknown</i>	Totalt <i>Total</i>	
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 480	1 097	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 331	2 133	2 254	991	262	77	18	11 066
1993	4 831	2 031	2 249	904	248	90	20	10 373
1994	4 595	1 957	2 171	945	239	94	11	10 012
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 876	1 986	2 195	998	287	78	2	10 422
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	983	245	92	-	10 836
2000	5 673	1 901	2 064	938	271	85	-	10 932
2001	5 476	1 954	2 006	908	249	107	1	10 701
2002	5 712	1 942	2 015	882	269	94	-	10 914
2003	5 648	1 912	1 915	876	256	102	-	10 709
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,3	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,2	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,7	17,9	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2003

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2003

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2003

Aikaisemmat keskeytykset

Tidigare aborter

Previous abortions

	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd <i>Unknown</i>	Totalt <i>Total</i>	
1987	9 454	2 528	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 699	2 454	620	147	45	23	78	11 066
1993	7 185	2 299	591	148	40	17	93	10 373
1994	6 930	2 132	602	142	44	28	134	10 012
1995	6 912	2 154	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 273	663	174	35	28	2	10 422
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 263	641	182	58	27	-	10 751
1999	7 775	2 184	624	171	52	29	1	10 836
2000	7 772	2 256	648	172	55	29	-	10 932
2001	7 571	2 244	616	187	48	33	2	10 701
2002	7 670	2 257	683	216	49	37	2	10 914
2003	7 316	2 369	698	197	85	44	-	10 709
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,0	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,1	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,1	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,1	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,1	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,1	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,1	-	100
1999	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,7	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,8	21,0	5,8	1,7	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,3	20,7	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,3	-	100

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2003, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2003, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2003, %

Pilleri ¹⁾	Kohdun-	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Jälkiehkäisy ²⁾	Yhteensä ³⁾
P-piller Pill	sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral <i>Hormone releasing</i> IUD	Spiral IUD	Kondom Condom	Sterilisering Sterilisation	ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel <i>Other contraceptives</i>	Ingenting Nothing	Okänd Unknown	Akut p-piller <i>Post-coital oral contraceptive</i>	Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	6,2	105,0
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	6,8	104,9
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	7,1	105,3
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	6,9	104,8
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	8,0	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	8,6	105,7
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	8,9	106,0
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	8,6	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	8,9	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	7,4	1,0
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	6,8	1,3
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	7,1	0,9
2001	8,6	0,1	1,4	50,0	0,4	1,7	35,7	5,0	1,2
2002	9,1	0,2	1,3	49,9	0,4	1,8	35,6	6,9	1,5
2003	9,7	0,3	1,0	48,0	0,2	2,4	35,5	8,4	2,3
									107,8

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-pillor eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en medel möjlig. More than one method possible.

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1999-2003

Tabell 9: Abortmetoder 1999-2003

Table 9: Methods for induced abortion 1999-2003

	Laajennus, Laa-jennus, imukaavinta imukaavinta	tyhjennys, Varhaisimu Utvigning,	Abortiivainae utrymning, utrymning med sug	Prostaglandiini Tidig Abortiv- medel	Keisari- leikkaus	Muu	Tuntematon	Yhteensä		
	Dilation, suction curretage	evacuation, suction curretage	Early suction	Abortion agent	Prostaglandin or other drug	Mifegyne	Kejsarsnitt	Annat	Okänd	Totalt
1999	9 376	396	426	422	178	-	4	33	1	10 836
2000	9 228	338	191	481	348	333	3	10	-	10 932
2001	7 192	229	159	492	838	1 758	5	28	-	10 701
2002	6 003	134	142	560	964	3 100	3	8	-	10 914
2003	4 994	109	104	617	1348	3 529	2	5	1	10 709
%										
1999	86,5	3,7	3,9	3,9	0,0	-	0,0	0,3	0,0	100
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
2001	67,2	2,1	1,5	4,6	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
2002	55,0	1,2	1,3	5,1	8,8	28,4	0,0	0,1	-	100
2003	46,6	1,0	1,0	5,8	12,6	33,0	0,0	0,0	0,0	100
Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week										
1999	9 284	328	424	7	130	-	-	18	-	10 191
2000	9 139	284	191	14	295	333	-	4	-	10 260
2001	7 117	195	159	22	797	1 756	-	8	-	10 054
2002	5 951	109	142	14	910	3 099	-	3	-	10 228
2003	4 957	87	104	16	1 347	3 529	-	2	-	10 042
%										
1999	91,1	3,2	4,2	0,1	1,3	-	-	0,2	-	100
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	-	0,0	-	100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	-	0,1	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	8,9	30,3	-	0,0	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	13,4	35,1	-	0,0	-	100
13. viikkolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter										
1999	91	68	2	415	48	-	4	15	1	644
2000	89	54	0	467	53	-	3	6	-	672
2001	75	34	0	470	41	2	5	20	-	647
2002	52	25	0	546	54	1	3	5	-	686
2003	37	22	0	601	1	-	2	3	-	666
%										
1999	14,1	10,6	0,3	64,4	7,5	-	0,6	2,3	0,2	100
2000	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	-	0,4	0,9	-	100
2001	11,6	5,3	0,0	72,6	6,3	0,3	0,8	3,1	-	100
2002	7,6	3,6	0,0	79,6	7,9	0,1	0,4	0,7	-	100
2003	5,6	3,3	0,0	90,2	0,2	-	0,3	0,5	-	100

Taulukko 10: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2003

Tabell 10: Steriliseringar efter kön 1951-2003

Table 10: Sterilisations by sex 1951-2003

Vuosi År Year	Naiset Kvinnor N	Miehet Män	Yhteensä Totalt Total	Naiset Kvinnor Women	Miehet Män	Yhteensä Totalt Total	Naiset Kvinnor Women	Miehet Män	Yhteensä Totalt Total	Per 1000 25-54 v. / år / year
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5	
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6	
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6	
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6	
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7	
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9	
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0	
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3	
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5	
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9	
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9	
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0	
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1	
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0	
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9	
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1	
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4	
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5	
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2	
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4	
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5	
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1	
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7	
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3	
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3	
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1	
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1	
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2	
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2	
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5	
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8	
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3	
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5	
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8	
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4	
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0	
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0	
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8	
1989	12 392	611	13 003	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0	
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1	
1991	12 782	512	13 294	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0	
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7	
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1	
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1	
1995	10 521	792	11 313	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0	
1996	12 561	1 810	14 371	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3	
1997	10 991	2 202	13 193	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8	
1998	9 594	1 921	11 515	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1	
1999	9 040	1 798	10 838	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8	
2000	8 699	1 771	10 470	83,1	16,9	100	7,9	1,5	4,7	
2001	7 262	1 762	9 024	80,5	19,5	100	6,6	1,6	4,0	
2002	6 725	1 591	8 316	80,9	19,1	100	6,2	1,4	3,8	
2003	5 883	1 637	7 520	78,2	21,8	100	5,5	1,5	3,4	

Taulukko 11: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2003

Tabell 11: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2003

Table 11: Sterilisations by hospital district 2003

Sairaanhoitopiiri⁽¹⁾

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations					
	Naiset-Kvinnor-Women		Miehet-Män-Men		Yhteensä-Totalt-Total	
	N	Per 1000 ⁽²⁾	N	Per 1000 ⁽²⁾	N	Per 1000 ⁽²⁾
Koko maa	5 883	5,5	1 637	1,5	7 520	3,4
- Hela landet - Whole country						
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	1 157	3,5	339	1,1	1 496	2,3
- Uusimaa - Nyland	920	4,8	273	1,4	1 193	3,1
- Helsinki - Helsingfors	237	1,8	66	0,5	303	1,2
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	628	6,7	160	1,7	788	4,2
Satakunta - Satakunta	250	5,6	111	2,4	361	4,0
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	197	5,9	49	1,4	246	3,6
Pirkanmaa - Birkaland	463	4,9	157	1,6	620	3,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	244	5,8	45	1,1	289	3,4
Kymenlaakso - Kymmenedalen	285	8,0	52	1,4	337	4,6
Etelä-Karjala - Södra Karelen	220	8,8	73	2,7	293	5,6
Etelä-Savo - Södra Savolax	119	6,0	39	1,8	158	3,8
Itä-Savo - Östra Savolax	108	9,0	3	0,2	111	4,5
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	259	7,9	65	1,8	324	4,7
Pohjois-Savo - Norra Savolax	356	7,2	78	1,5	434	4,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland	166	3,2	155	2,8	321	3,0
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	154	4,3	55	1,4	209	2,8
Vaasa - Vasa	163	5,2	18	0,5	181	2,8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	93	6,4	29	1,9	122	4,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	554	7,5	134	1,7	688	4,5
Kainuu - Kajanaland	77	4,9	5	0,3	82	2,5
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	80	6,2	27	1,9	107	4,0
Lappi - Lappland	286	12,1	34	1,3	320	6,5
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	22	4,0	0	0,0	22	2,0
Ulkomaat - Utlandet - Foreign countries	1	-	3	-	4	-
Tuntematon - Okänd - Unknown	1	-	6	1,5	7	-

1) **Potilaan asuinpaikan mukaan.** Enligt hemkommun. According to patient's domicile.

2) **Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti.** Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år

Per 1000 women/men aged 25-54 years

Taulukko 12: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2003

Tabell 12: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994-2003

Table 12: Sterilisations by age group among women 1994-2003

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23	24
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201	182
30-34	2 485	2 387	2 766	2 411	2 054	2 022	1 771	1 469	1 333	1 113
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 656	3 579	2 865	2 762	2 363
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 383	2 107	1 912
45-49	579	566	643	527	489	398	409	309	295	285
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	-	4
Tuntematon - Okänd	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-
<i>Unknown</i>										
Yhteensä - Totalt	10 926	10 521	12 561	10 991	9 594	9 040	8 699	7 262	6 725	5 883
<i>Total</i>										
%										
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8	18,9
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,5	41,1	40,2
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3	32,5
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4	4,8
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,1
Tuntematon - Okänd	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-
<i>Unknown</i>										
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>										
Per 1000										
25-29	2,4	2,2	2,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4	1,3	1,2
30-34	13,3	12,8	14,9	13,1	11,3	11,4	10,3	8,8	8,3	7,2
35-39	22,2	21,1	26,1	22,8	20,2	19,6	19,2	15,5	15,0	13,0
40-44	15,6	15,7	18,8	17,3	15,1	13,9	14,0	12,7	11,3	10,3
45-49	2,8	2,7	3,0	2,5	2,4	2,0	2,1	1,6	1,5	1,5
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,4

Taulukko 13: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2003

Tabell 13: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994-2003

Table 13: Sterilisations among men by age group 1994-2003

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5	3
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34	26
30-34	107	147	328	415	347	336	309	290	298	258
35-39	199	271	575	704	615	575	596	556	506	552
40-44	152	204	496	604	555	491	505	529	440	462
45-49	86	108	266	319	263	241	230	238	214	239
50-54	37	45	100	129	102	122	99	101	93	97
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Unknown</i>										
Yhteensä - Totalt	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 771	1 762	1 591	1 637
<i>Total</i>										
%										
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1	1,6
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,5	18,7	15,8
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,7	31,6	31,8	33,7
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,5	30,0	27,7	28,2
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,5	13,5	14,6
50-54	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,7	5,8	5,9
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
<i>Unknown</i>										
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>										
Per 1000										
25-29	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
30-34	0,5	0,8	1,7	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6
35-39	1,0	1,4	3,0	3,6	3,2	3,0	3,1	2,9	2,6	2,9
40-44	0,7	1,0	2,4	3,0	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4
45-49	0,4	0,5	1,2	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2
50-54	0,3	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5

Taulukko 14: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2003

Tabell 14: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2003

Table 14: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among women 2003

Synnyttänyt 3 lasta	3 alaikäistä lasta	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 or more	Lääketiet. Medicinsk vaikeudet	Ehkäisy- vaikeudet förhindra en graviditet <i>Difficulties in contra- ception</i>	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppslyte hos barn <i>Serious disease or defect of offspring</i>	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn <i>Limited ability to take care of children</i>	Tuntematon Yhteensä ¹⁾ Okänd Unknown Totalt
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status							
Naimisissa							
- Gift - Married	1 904	77	3 690	21	169	0	2
Naimaton	368	18	1 104	5	62	1	6
- Ogift - Single							0
Leski	20	1	41	0	2	0	0
- Änka - Widowed							64
Eronnut	338	11	830	0	43	0	0
- Frånskild - Divorced							2
Tuntematon	1	0	1	0	0	0	0
- Okänd - Unknown							2
Ikä - Ålder - Age⁽²⁾							
-19	0	0	0	0	0	3	0
20-24	12	2	0	1	3	5	0
25-29	154	7	0	13	20	0	0
30-34	593	29	1 109	3	54	0	0
35-39	1 083	49	2 358	7	104	0	2
40-44	712	19	1 911	1	84	0	1
45-49	77	1	284	1	11	0	0
50-	0	0	4	0	0	0	0
Tuntematon	0	0	0	0	0	0	0
- Okänd - Unknown							
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries							
0	0	0	261	2	13	1	7
1	0	3	626	2	30	0	1
2	30	10	2 341	11	143	0	0
3	1 693	48	1 589	4	66	0	2
4	650	33	604	2	16	0	0
5	165	10	157	2	4	0	0
6	43	0	38	1	4	0	0
7	22	0	22	0	0	0	0
8	11	1	11	0	0	0	0
9-	17	2	17	2	0	0	0
Tuntematon	0	0	0	0	0	0	0
- Okänd - Unknown							
Yhteensä	2 631	107	5 666	26	276	1	8
- Totalt - Total							3
1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. <i>More than one indication possible.</i>							
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. <i>Age on the day of operation.</i>							

Taulukko 15: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2003

Tabell 15: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2003

Table 15: Sterilisations by indication, marital status and age among men 2003

3 alaikäistä lasta 3 minder- åriga barn 3 children under 18 yrs	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 or more	Lääketiet. Medicinsk vaikeudet Medical Difficulties in contra- ception	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppslyte hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn <i>Limited ability</i> to take care of <i>children</i>	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
--	--	--	---	---	---	--------------------------------	---

Siviilisääty - Civilstånd - Marital status

Naimisissa - Gift - Married	366	1 277	0	52	0	0	1	1 696
Naimaton - Ogift - Single	29	149	0	13	0	2	0	193
Leski - Änka - Widowed	3	4	0	0	0	0	0	7
Eronnut - Frånskild - Divorced	31	173	0	5	0	0	0	209
Tuntematon - Okänd - Unknown	1	3	0	0	0	0	0	4

Ikä - Ålder - Age⁽²⁾

-19	0	0	0	0	0	1	0	1
20-24	1	0	0	1	0	0	0	2
25-29	21	0	0	8	0	1	0	30
30-34	72	258	0	10	0	0	0	340
35-39	154	552	0	20	0	0	0	726
40-44	118	461	0	19	0	0	1	599
45-49	50	238	0	11	0	0	0	299
50-	14	97	0	1	0	0	0	112
Tuntematon - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0

Yhteensä

- Totalt - Total	430	1 606	0	70	0	2	1	2 109
------------------	-----	-------	---	----	---	---	---	-------

1) **Useampi peruste mahdollinen.** Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) **Ikä toimenpiteen suorituspäivänä.** Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*