

Sosiaali- ja terveystilastot

PL 220, 00531 Helsinki

Puh. (09) 3967 2346 Hanna Eronen

Puh. (09) 3967 2359 Anne Soimula

Puh. (09) 3967 2279 Mika Gissler

Fax. (09) 3967 2324

e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347 (paperi)


**Raskaudenkeskeytykset - vuoden 2002 ennakkotiedot
tilastotiedote 5/2003**

Vuoden 2002 ennakkotietojen mukaan tehtiin 10 851 raskaudenkeskeytystä eli 9,1 tuhatta hedelmällisyysikäistä naisten kohden. Tämä on noin 150 keskeytystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1973 jälkeen keskeytykset vähenivät vuoteen 1995 asti sekä absoluuttisesti että suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin. Vuonna 1995 keskeytyksien määrä jäi alle kymmentuhannen, mutta tämän jälkeen keskeytyksiä on ollut vuosittain 10 000 - 11 000.

Vuotta 2001 lukuun ottamatta eniten keskeytyksiä on tehty 20-24 -vuotiaille (2620). Vuonna 2002 tehtiin alle 20-vuotiaille lähes yhtä monta keskeytystä: 2570. Vappuna 2002 reseptivapauden saaneella jälkikiekkäisillä ei näyttäisi olleen suurta vaikutusta keskeytyslukuihin. Alle 20-vuotiaille vuoden viimeisen neljänneksen keskeytysluvut olivat vuotta aikaisempaa matalampia, mutta alkuvuodesta jopa selvästi edellisvuotta korkeampia. 20-24 -vuotiaille keskeytysluvut olivat koko vuoden edellisvuotta korkeampia.

Kuvio 1:

Alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset neljännesvuosittain 2001-2002



Eniten keskeytyksiä (86,5 % vuonna 2002) tehdään vuosittain ns. sosiaalisella perusteella eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi. Muut yleisimmät perusteet ovat alle 17 vuoden ikä (6,8 %), yli 40 vuoden ikä (3,9 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). Lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviaasta tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,5 prosenttia keskeytyksistä vuonna 2002. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi suoritettuja keskeytyksiä on vuosittain vähän yli 200 (2,1 %).

Noin 94 prosenttia keskeytyksistä suoritetaan ennen kahdennentoista raskausviikon päättymistä ja nykyisin suurin osa, 88 prosenttia vuonna 2002, päiväkirurgisesti tai lääkkeellisesti. Lääkkeellinen keskeytys on yleistynyt nopeasti: vuonna 2002 näin keskeytettiin 27 prosenttia kaikista keskeytyksistä, kun vastaava luku edellisvuonna oli 17 prosenttia. Vuosittain keskeytetään muutamia kymmeniä (0,4 % vuonna 2002) yli 20 viikkoa kestäneitä raskauksia, pääasiassa todetun vakavan sikiövaurion perusteella ja muutama naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi.

Asuinkunnan mukaan tarkasteltuna eniten keskeytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin tehtiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja Helsingissä (11/1000) vuonna 2002. Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Savossa (alle 7/1000).

Keskeytyspotilaista 22 prosenttia on naimisissa ja 15 prosenttia avoliitossa. Naimattomien osuus on 54 prosenttia sekä eronneiden ja leskien osuus noin 10 prosenttia. Lähes puolella keskeytyspotilaista on vähintään yksi synnytys. Vähintään yksi aiempi keskeytys on 21 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä 9 prosentilla keskeyttäneistä.

Jonkinlaista ehkäisymenetelmää ilmoituslomakkeen mukaan oli tämän raskauden alkaessa käyttänyt noin 58 prosenttia potilaista. Ns. varmoja ehkäisykeinoja (sterilointia, E-tabletteja, kohdunsisäistä hormoniehkäisintä tai kierukkaa) oli käyttänyt noin 17 prosenttia. Jälkiehkäisyä käyttäneitä oli vähän yli prosentti (1,5 %).

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2002

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2002

Taulukko 3: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2002

Taulukko 4: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2002

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2002

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2002

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2002

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2002

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998-2002

Lähteet:

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Keskeytyksiä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970) sekä sen nojalla annetun asetuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkäriin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970; Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin tietokannassa. Vuosien 1987-2001 aineistoa on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin tilastoihin mukaan ottamattomia tapauksia on tallennettu. Tämän vuoksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista. Vuoden 2002 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 31.3.2003. Lopulliset, tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2003.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät:


Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Aborter – preliminära data för år 2002 statistikmeddelande 5/2003

Enligt förhandsuppgifter för år 2002 utfördes 10 851 aborter, d.v.s. 9,1 per tusen kvinnor i fertil ålder. Det här innebär en ökning på ca 150 aborter jämfört med året innan. Efter år 1973 minskade antalet aborter ända fram till år 1995 såväl absolut som i relation till antalet kvinnor i fertil ålder. År 1995 understeg antalet aborter tiotusen, men därefter har antalet varierat mellan 10 000 och 11 000.

Med undantag för år 2001 har de flesta aborterna utförts i åldersgruppen 20–24 år (2620). År 2002 utfördes nästan lika många aborter i åldersgruppen under 20 år, d.v.s. 2570. Akut p-piller blev receptfritt 1 maj 2002, men förefaller inte nämnvärt ha påverkat antalet aborter. I åldersgruppen under 20 år var antalet aborter under det sista kvartalet av nämnda år lägre än under föregående år, men i början av året till och med betydligt högre än under året innan. När det gäller 20–24-åringar var antalet aborter under hela året högre än under föregående år.

Figur 1:
Antalet aborter i åldersgruppen under 25 år per kvartal åren 2001–2002



De flesta aborter (86,5 % år 2002) utförs årligen på social indikation, d.v.s. då graviditeten skulle innebära en betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden eller andra omständigheter. De övriga vanligaste indikationerna är kvinnans ålder – under 17 år (6,8 %) eller över 40 år (3,0 %) samt fyra tidigare förlossningar (2,1 %). År 2002 utfördes 0,5 procent av aborterna på medicinsk indikation, d.v.s. till följd av sjukdom, kroppsslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. Antalet aborter som utförs på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada är något över 200 (2,1 %) årligen.

Ungefär 94 procent av aborterna utförs när graviditeten varat mindre än tolv graviditetsveckor och största delen, 88 procent år 2002, utförs som ett dagkirurgiskt ingrepp eller induceras med läkemedel. Läkemedelsinducerad abort har blivit allt allmännare: år 2002 användes metoden i 27 procent av alla aborter, medan motsvarande antal året innan var 17 procent. Årligen avbryts några tiotals (0,4 % år 2002) graviditeter efter den 20:nde graviditetsveckan, huvudsakligen till följd av konstaterad grav fosterskada, och några få på grund av fara för kvinnans liv eller hälsa.

Efter patientens hemkommun utfördes år 2002 mest aborter i relation till kvinnor i fertil ålder i Västerbottens sjukvårdsdistrikt och i Helsingfors (11/1000). Antalet aborter var lägst i Södra Österbotten, i Mellersta Österbotten, i Kajanaland och i Östra Savolax (färre än 7/1000).

Av abortpatienterna är 22 procent gifta och 15 procent lever i samboförhållande. Andelen ogifta är 54 procent och andelen frånskilda och änkor är ca 10 procent. Nästan hälften av abortpatienterna har genomgått minst en förlossning och 21 procent har redan genomgått minst en abort, medan 9 procent har minst två tidigare aborter bakom sig.

Enligt anmälningsformuläret hade ca 58 procent av patienterna använt någon form av preventivmedel när graviditeten började. Ungefär 17 procent av kvinnorna hade använt s.k. säker preventivmetod (sterilisering, p-piller, hormonspiral eller spiral). Något över en procent hade använt akut p-piller (1,5 %).

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp åren 1969–1970, 1975–2002

Tabell 2: Indikationer för abort 1970–2002

Tabell 3: Utförda aborter efter indikation 2002

Tabell 4: Aborter efter gestationslängd 1985–2002

Tabell 5: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2002

Tabell 6: Aborter efter tidigare aborter 1987–2002

Tabell 7: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2002

Tabell 8: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2002

Tabell 9: Abortmetoder 1998–2002

Källor:

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den första juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan år 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap 239/1970 och de förordningar som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och § 6 i förordningen (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Medicinalstyrelsens publikationer som har utgivits som en del av den officiella statistiken har använts som källor för den statistik som gäller tidigare år. Från och med 1987 har registret funnits i Stakes databas. Materialet för åren 1987–2001 har preciserats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har ingått i statistiken. Därför avviker en del av uppgifterna från den statistik som tidigare har publicerats. Uppgifterna för år 2002 är preliminära och baserar sig på situationen för den 31 mars 2003. De slutgiltiga och granskade uppgifterna kommer att publiceras hösten 2003.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp är det viktigt att beakta att de uppgifter om ålder som förekommer i registret sedan 1994 baserar sig på patientens ålder på operationsdagen, medan patientens ålder tidigare angavs som ålder vid slutet av året. I den här publikationen har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på operationsdagen.

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

STAKES/STAKES Information
Social and Health Statistics

P.O. Box 220, 00531 Helsinki, Finland
Tel. + 358 9 3967 2346 Hanna Eronen
Tel. + 358 9 3967 2359 Anne Soimula
Tel. + 358 9 3967 2279 Mika Gissler
Fax. + 358 9 3967 2324
e-mail: forename.surname@stakes.fi

1 April 2003


ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347 (paper)

Induced abortions – preliminary data for 2002
Statistical Summary 5/2003

According to the preliminary data for 2002, 10 851 induced abortions were performed, i.e. 9.1 per one thousand women of fertile age. This is approximately 150 more abortions than in the preceding year. From 1973, the number of abortions declined until 1995, both absolutely and in relation to women of fertile age. In 1995, the number of abortions fell below ten thousand but since then, the number of abortions performed annually has varied between 10 000–11 000.

With the exception of 2001, the majority of induced abortions were performed on women aged 20–24 years (2620). In 2002, almost as many abortions were performed on women under 20 years: 2570. Post-coital oral contraception became prescription-free on 1 May 2002 but it does not seem to have had a great effect on the abortion figures. For women under 20 years, the abortion figures for the last quarter of the year were lower than in the preceding year, while the figures for the first months of the year were noticeably higher than in the preceding year. For women aged 20–24 years, the abortion figures throughout the year were higher than in the preceding year.

Figure 1:
Quarterly figures for induced abortions among women under 25, 2001–2002



The majority of induced abortions (86.5% in 2002) performed annually are done for social reasons, i.e. the birth of a child would place considerable strain on the mother considering her living or other conditions. The other most common reasons are the patient being under 17 years of age (6.8%), or over 40 years of age (3.9%) or having given birth to four children (2.1%). In 2002, 0.5 per cent of induced abortions were performed on medical indication, i.e. on the grounds of the danger caused by a pregnancy to a woman's health or life due to illness, physical disability or weakness. Just over 200 abortions (2.1%) are performed annually due to potential or detected foetal defect.

About 94 per cent of induced abortions are performed before the end of the twelfth week of gestation. Nowadays, the majority of abortions, 88 per cent in 2002, are performed as day surgery or induced by drugs. Drug-induced abortion has rapidly become widespread: in 2002, 27 per cent of all induced abortions were carried out using this method whereas the corresponding figure for the preceding year was 17 per cent. A few dozen pregnancies are terminated annually (0.4% in 2002) after the twentieth week of gestation, mostly due to a detected serious foetal defect and a few on the grounds of risk to the woman's health or life caused by a pregnancy.

When examined by the patient's place of domicile, the majority of abortions in relation to women of fertile age in 2002 were performed in the Southwest Lapland hospital district and in Helsinki (11/1000). The lowest abortion figures were observed in Southern Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, Kainuu, and Eastern Savo (below 7/1000).

A total of 22 per cent of abortion patients were married and 15 per cent were cohabiting. Unmarried women accounted for 54 per cent and divorced and widowed women for about 10 per cent. Almost one half of abortion patients had already given birth to at least one child. A total of 21 per cent of abortion patients had had at least one prior termination and 9 per cent had had a minimum of two prior terminations.

According to the notifications, about 58 per cent of patients reported that they had been using some method of contraception at the time of conception. About 17 per cent reported having used so-called "safe" methods (sterilisation, the pill, intrauterine hormone-releasing or other IUD). A little over one per cent (1.5%) had used post-coital oral contraception.

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2002

Table 2: Indications for induced abortions, 1970–2002

Table 3: Induced abortions by indication, 2002

Table 4: Induced abortions by gestation length, 1985–2002

Table 5: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2002

Table 6: Induced abortions by previous abortions, 1987–2002

Table 7: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2002

Table 8: Induced abortions by hospital district and age, 2002

Table 9: Methods for induced abortion, 1998–2002

Sources:

In Finland the first Act on Induced Abortion came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion was passed in 1970.

According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970 as well as the Decree on Induced Abortion 359/1970; Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. Data for 1987-2001 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding cases that had previously not been included. For these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics. The data for 2002 are preliminary and based on the situation on 31 March 2003. The final, checked data will be published in the autumn 2003.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986-1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Terms and definitions

Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2002*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2002*

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2002*

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntynyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	119,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 647	199,8	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 064	165,9	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 370	160,1	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 011	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 870	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 422	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 750	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 832	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 700	191,8	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002*	10 851	195,4	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

*) Ennakkotieto.

Prelimär information.

Preliminary information.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2002*, %

Tabell 2: Indikationer för aborter 1970-2002*, %

Table 2: Indications for abortions 1970-2002*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,3	84,4	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 647
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,2	0,0	4,3	6,3	1,6	1,7	..	-	100	11 064
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,1	1,9	1,6	..	0,0	100	10 370
1994	0,5	85,5	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	..	0,0	100	10 011
1995	0,5	86,2	0,0	3,9	5,4	2,0	2,0	..	0,0	100	9 870
1996	0,4	86,8	-	3,7	4,7	2,3	2,1	..	0,0	100	10 422
1997	0,3	86,9	0,0	4,6	4,5	2,0	1,7	..	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 750
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,1	0,0	100	10 832
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 932
2001	0,4	84,8	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 774 ⁽⁴⁾
2002*	0,5	86,5	0,1	6,8	3,9	2,1	0,5	1,4	0,0	100	11 038 ⁽⁴⁾

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. Under the current law.

2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över totala antalet. Statistics on available total number only.

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.

4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.

Taulukko 3: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2002*

Tabell 3: Utförda aborter efter indikation 2002*

Table 3: Abortions by indication 2002*

Sivillisäätö, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication								Yhteensä ¹⁾ Totalt Total	
	Lääketiet. Medicinsk	Sosiaalinen Social	Eettinen Etisk	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 vuotta Över 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect		
Sivillisäätö - Civilstånd - Marital status										
Naimisissa - Gift - Married	30	1 829	1	3	210	136	24	98	2 331	
Naimaton - Ogift - Single	22	6 683	5	732	96	40	27	51	7 656	
Leski - Änka - Widowed	-	34	-	-	6	4	-	-	44	
Eronnut - Frånskild - Divorced	4	832	2	-	106	49	5	4	1 002	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
Yhteensä - Totalt - Total	56	9 383	8	735	418	229	56	153	11 038	
Ikä - Ålder - Age²⁾										
-13	-	-	-	9	-	-	-	-	9	
14	-	-	-	80	-	-	-	-	80	
15	-	1	-	185	-	-	-	-	186	
16	-	1	-	385	-	-	-	-	386	
17	-	457	1	76	-	-	-	-	534	
18	-	676	1	-	-	-	-	2	679	
19	2	693	-	-	-	-	-	3	696	
20-24	9	2 595	2	-	-	3	2	9	2 620	
25-29	8	1 840	1	-	-	24	14	34	1 921	
30-34	23	1 595	2	-	-	58	13	45	1 736	
35-39	11	1 275	-	-	-	88	14	38	1 426	
40-44	2	238	1	-	388	52	13	21	715	
45-49	1	10	-	-	30	4	-	1	45	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Yhteensä - Totalt - Total	56	9 383	8	735	418	229	56	153	11 038	
Synnytykset - Förlossningar - Deliveries										
0	15	4 815	5	729	43	-	29	64	5 700	
1	16	1 786	1	6	67	-	14	50	1 940	
2	19	1 824	1	-	149	-	8	30	2 031	
3	4	778	1	-	99	13	3	5	903	
4	1	140	-	-	39	156	2	2	340	
5	1	28	-	-	15	46	-	-	90	
6	-	8	-	-	3	9	-	1	21	
7	-	3	-	-	3	5	-	-	11	
8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
9-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Yhteensä - Totalt - Total	56	9 383	8	735	418	229	56	153	11 038	

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.

Taulukko 4: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2002*

Tabell 4: Aborter efter gestationslängd 1985-2002*

Table 4: Abortions by gestation length 1985-2002*

Viikkoja/veckor/weeks

	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22- Puuttuu Saknas Missing	Yhteensä Totalt Total	
1985	1 853	2 597	3 086	2 647	1 987	949	156	216	191	139	7	4	0	13 833
1986	1 947	2 595	2 982	2 459	1 784	869	134	192	156	175	13	13	0	13 319
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 799	858	144	221	152	157	17	16	4	12 647
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	0	11 737
1992	1 915	2 212	2 374	1 987	1 340	627	136	168	133	126	33	13	0	11 064
1993	1 875	2 117	2 306	1 808	1 158	550	129	159	133	102	24	9	0	10 370
1994	1 988	2 107	2 140	1 614	1 096	461	114	177	135	124	34	21	0	10 011
1995	1 886	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	0	9 870
1996	2 019	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	6	10 422
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	22	10 250
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 074	459	184	161	125	113	27	13	3	10 750
1999	2 319	2 447	2 318	1 550	1 097	456	174	200	134	98	25	13	1	10 832
2000	2 605	2 372	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	0	10 932
2001	3 553	2 290	1 726	1 213	916	356	179	179	144	101	30	13	0	10 700
2002*	3 750	2 387	1 697	1 094	875	382	219	177	128	102	30	10	0	10 851
%														
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0	100
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	0,0	100
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	0,0	100
1992	17,3	20,0	21,5	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	0,0	100
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	0,0	100
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,1	100
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,2	100
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	0,0	100
2001	33,2	21,4	16,1	11,3	8,6	3,3	1,7	1,7	1,3	0,9	0,3	0,1	0,0	100
2002*	34,6	22,0	15,6	10,1	8,1	3,5	2,0	1,6	1,2	0,9	0,3	0,1	0,0	100

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2002*

Tabell 5: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2002*

Table 5: Abortions by previous deliveries 1987-2002*

	Aikaisempia synnytyksiä Tidigare förlossningar Previous deliveries					5- Okänd Unknown	Tuntematon Totalt Total	Yhteensä Totalt Total
	0	1	2	3	4			
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 419	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 647
1990	6 149	2 111	2 480	1 097	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 329	2 133	2 254	991	262	77	18	11 064
1993	4 829	2 030	2 249	904	248	90	20	10 370
1994	4 594	1 957	2 171	945	239	94	11	10 011
1995	4 689	1 907	2 054	900	229	90	1	9 870
1996	4 876	1 986	2 195	998	287	78	2	10 422
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 011	274	85	-	10 749
1999	5 431	1 950	2 132	982	245	92	-	10 830
2000	5 673	1 901	2 064	938	271	85	-	10 932
2001	5 475	1 955	2 005	908	249	107	1	10 700
2002*	5 683	1 927	2 002	878	268	93	-	10 851
	%							
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,3	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,7	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,2	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,1	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,7	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,4	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,7	19,0	21,0	9,6	2,7	0,7	0,0	100
1997	48,5	17,8	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,6	0,8	-	100
1999	50,2	18,0	19,7	9,1	2,3	0,9	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002*	52,4	17,8	18,4	8,1	2,5	0,9	-	100

*) **Ennakkotieto.** Prelimär information. *Preliminary information.*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2002*

Tabell 6: Aborter efter tidigare aborter 1987-2002*

Table 6: Abortions by previous abortions 1987-2002*

	Aikaisempia keskeytyksiä					5- Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total	
	0	1	2	3	4			
1987	9 454	2 528	537	144	33	13	12 986	
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	12 738	
1989	9 153	2 526	547	124	28	20	12 647	
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	12 217	
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	11 737	
1992	7 697	2 454	620	147	45	23	11 064	
1993	7 183	2 299	590	148	40	17	10 370	
1994	6 929	2 132	602	142	44	28	10 011	
1995	6 911	2 153	578	154	47	24	9 870	
1996	7 247	2 273	663	174	35	28	10 422	
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	10 250	
1998	7 579	2 263	641	182	58	27	10 750	
1999	7 773	2 182	624	171	52	29	10 832	
2000	7 772	2 256	648	172	55	29	10 932	
2001	7 571	2 243	616	187	48	33	10 700	
2002*	7 630	2 244	675	216	47	37	10 851	
	%							
1987	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1988	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1989	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1990	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1991	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1992	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1993	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1994	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1995	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1996	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100
1997	70,5	21,1	6,0	1,7	0,5	0,3	0,1	100
1998	71,8	20,1	5,8	1,6	0,5	0,3	-	100
1999	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	21,0	5,8	1,7	0,4	0,3	-	100
2001	70,8	21,0	5,8	1,7	0,4	0,3	0,0	100
2002*	70,3	20,7	6,2	2,0	0,4	0,3	0,0	100

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2002*, %

Tabell 7: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2002*, %

Table 7: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2002*, %

	Pilleri ¹⁾	Kohdunsisäinen hormoniekhäisin	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Jälkiehäisy ²⁾	Yhteensä ³⁾
	P-piller Pill	Hormonspiral Hormone releasing IUD	Spiral IUD	Kondom Condom	Sterilisering Sterilisation	Annat Other	Ingenting Nothing	Okänd Unknown	Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	34,1	4,1	..	101,2
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	33,7	4,5	..	100,7
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	34,8	4,7	..	101,0
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	32,6	4,6	..	100,6
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	32,0	5,4	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	33,7	5,7	..	100,6
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	32,6	6,0	..	101,4
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	31,7	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	31,0	6,2	..	100,0
1998	7,2	1,0	1,9	50,0	0,6	2,2	32,7	5,0	1,0	101,6
1999	7,9	1,3	1,7	50,5	0,6	1,9	32,6	4,5	1,3	102,3
2000	8,5	0,9	1,5	49,7	0,4	1,9	35,4	4,7	0,9	103,9
2001	8,6	0,1	1,4	50,0	0,4	1,7	35,7	5,0	1,2	104,1
2002*	9,0	0,2	1,3	50,0	0,4	1,8	35,6	6,8	1,5	106,6

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en medel möjlig. More than one method possible.

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2002*

Tabell 8: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2002*

Table 8: Abortions by hospital district and age 2002*

Sairaanhoitopiiri ¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							15-49
	15-19 ²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Helsinki - Helsingfors	22,6	17,7	13,0	13,2	9,4	4,4	0,1	11,2
Uusimaa - Nyland	16,6	19,1	14,0	11,4	8,6	3,9	0,2	9,8
Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands	16,4	16,3	11,7	10,7	7,6	3,0	0,0	9,1
Satakunnan - Satakunta	17,3	17,0	11,5	9,1	6,3	3,5	0,1	8,6
Kanta-Hämeen - Centrala Tavastlands	15,0	14,5	14,9	8,4	5,5	3,4	0,2	8,1
Pirkanmaan - Birkalands	15,9	14,5	12,5	11,1	7,3	2,6	0,4	8,8
Päijät-Hämeen - Päijänne-Tavastlands	13,8	18,9	14,3	9,0	6,5	2,9	0,0	8,6
Kymenlaakson - Kymmenedalens	18,4	18,1	12,3	11,8	8,6	3,7	0,6	9,6
Etelä-Karjalan - Södra Karelens	13,0	15,5	11,8	13,1	6,7	2,5	0,0	8,2
Etelä-Savon - Södra Savolax	14,1	18,1	10,5	7,4	5,6	2,2	0,2	7,5
Itä-Savon - Östra Savolax	12,9	11,1	14,0	9,0	4,7	3,0	0,0	6,9
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens	16,9	14,0	10,5	8,7	8,1	3,0	0,3	8,2
Pohjois-Savon - Norra Savolax	15,0	14,6	10,0	7,7	6,3	2,7	0,2	7,6
Keski-Suomen - Mellersta Finlands	14,6	15,8	10,8	9,9	6,6	3,9	0,4	8,6
Etelä-Pohjanmaan - Syd-Österbottens	14,4	12,8	8,8	6,8	5,3	1,4	0,0	6,7
Vaasan - Vasa	11,9	16,5	10,8	10,0	9,0	3,4	0,5	8,6
Keski-Pohjanmaan - Mellersta Österbottens	8,2	13,7	9,3	7,4	7,9	3,2	0,0	6,8
Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens	15,4	12,5	10,9	9,1	6,7	2,6	0,2	8,1
Kainuun - Kajanalands	16,4	10,3	10,7	5,5	6,9	1,6	0,0	6,9
Länsi-Pohjan - Västerbottens	18,6	31,0	14,4	12,0	8,9	2,8	0,7	11,5
Lapin - Lapplands	17,0	15,0	14,4	15,3	6,2	4,4	0,4	9,4
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	9,7	18,8	23,4	15,9	8,2	3,3	0,0	10,4
Yhteensä - Summa - Total	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1

1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiaista naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

*) Ennakkotieto. Prelimär information. *Preliminary information.*

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998-2002*

Tabell 9: Abortmetoder 1998-2002*

Table 9: Methods for abortions 1998-2002*

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisimu	Abortiivaine	Prostaglandiini tai muu lääke	Lääkkeellinen	Keisarileikkaus	Muu	Tuntematon	Yhteensä
	Utvidgning, utrymning med sug	utrymning, utrymning med sug	Tidig utrymning med sug	Abortiv- medel	Prostaglandin eller annat läkemedel	Läkemedel	Kejsarsnitt	Annat	Okänd	Totalt
	Dilation, suction curretage	Dilation, evacuation, suction curretage	Early suction	Abortion agent	Prostaglandin or other drug	Medical	Caesarean section	Other	Unknown	Total
1998	9 436	366	403	288	230	-	5	22	-	10 750
1999	9 373	396	425	422	178	-	4	33	1	10 832
2000	9 228	338	191	481	348	333	3	10	-	10 932
2001	7 191	229	159	491	838	1 758	5	28	-	10 700
2002*	5 989	133	141	541	1089	2 948	2	8	0	10 851
%										
1998	87,8	3,4	3,7	2,7	2,1	-	0,0	0,2	-	100
1999	86,5	3,7	3,9	3,9	1,6	-	0,0	0,3	0,0	100
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
2001	67,2	2,1	1,5	4,6	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
2002*	55,2	1,2	1,3	5,0	10,0	27,2	0,0	0,1	0,0	100
Alle / Under 13 viikkoa / veckor / weeks										
1998	9 288	281	400	5	140	-	0	10	0	10 124
1999	9 281	328	423	7	130	-	0	18	0	10 187
2000	9 139	284	191	14	295	333		4	0	10 260
2001	7 117	195	159	22	797	1 756	0	8	0	10 054
2002*	5 938	108	141	14	1 033	2 948	0	3	0	10 185
%										
1998	91,7	2,8	4,0	0,0	1,4	-	0,0	0,1	0,0	100
1999	91,1	3,2	4,2	0,1	1,3	-	0,0	0,2	0,0	100
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	0,0	0,1	0,0	100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	0,0	0,1	0,0	100
2002*	58,3	1,1	1,4	0,1	10,1	28,9	0,0	0,0	0,0	100
13+ viikkoa / veckor / weeks										
1998	146	85	2	283	90	-	5	12	0	623
1999	91	68	2	415	48	-	4	15	1	644
2000	89	54		467	53	0	3	6	0	672
2001	75	34	0	469	41	2	5	20	0	646
2002*	51	25	0	527	56	0	2	5	0	666
%										
1998	23,4	13,6	0,3	45,4	14,4	-	0,8	1,9	0,0	100
1999	14,1	10,6	0,3	64,4	7,5	-	0,6	2,3	0,2	100
2000	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	0,0	0,4	0,9	0,0	100
2001	11,6	5,3	0,0	72,6	6,3	0,3	0,8	3,1	0,0	100
2002*	7,7	3,8	0,0	79,1	8,4	0,0	0,3	0,8	0,0	100

*) Ennakkotieto. Prelimär information. Preliminary information.