

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2004

Aborter och steriliseringar 2004 Induced abortions and sterilisations 2004

Raskaudenkeskeytykset

Vuonna 2004 tehtiin 11 091 raskaudenkeskeytystä eli 9,4 tuhatta hedelmällisyysikäistä (15-49 -vuotiasta) naista kohti. Keskeytysten määrä kasvoi kolme prosenttia eli hieman yli 300 keskeytystä edellisestä vuodesta. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset lisääntyivät 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten keskeytykset lisääntyivät 20-24 -vuotiailla (9,5 %). Myös 25-29 -vuotiaiden keskeytysten määrä lisääntyi 4,7 %. Keskeytykset vähenivät 30-39 -vuotiailla 3 %.

Sosiaaliset syyt raskaudenkeskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen. Vuonna 2004 oli 90,6 % keskeytyksistä tehty sosiaalisiin perustein eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi. Muut yleisimmät perusteet olivat alle 17 vuoden ikä (6,4 %), yli 40 vuoden ikä (3,7 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). Lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinvaiasta tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,4 prosenttia keskeytyksistä. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi suoritettuja keskeytyksiä oli 2,3 % kaikista keskeytyksistä. Määrä ei juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta.

Hanna Eronen
 +358 9 3967 2346

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279

sähköposti:
 etunimi.sukunimi@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveysalan
 tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
 centralen för social- och
 hälsövården


National Research and
 Development Centre for
 Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
 ISSN 1459-2347
 (painettu - printed)



Kuvio 1: Alle 30-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä kohti 2000-2004

Sairaanhoitopiireittäin tarkasteluna vuonna 2004 eniten keskeytyksiä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti tehtiin Länsi-Pohjan (11,1) ja Helsingin ja Uudenmaan (10,9) sairaanhoitopiireissä. Alhaisimmat keskeytyksluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla (6,8) ja Kainuussa (7,1).

Ennen 6. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus (36,3 %) lisääntyi edelleen vuonna 2004. Suurin osa keskeytyksistä (93,5 %) tehtiin ennen 12. raskausviikkoa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus kaikista keskeytyksistä lisääntyi ollen 35,9 %. Raskaudenkeskeyttäneistä 31,8 % oli vähintään yksi aikaisempi keskeytys ja 47,3 % vähintään yksi aikaisempi synnytys.

Raskauden alkaessa 63,5 % oli käyttänyt jotain ehkäisymenetelmää ja 2,1 % oli käyttänyt jälkielekäänsyä. Jälkielekäänsyä käyttäneiden osuus pieneni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 20-vuotiaista keskeyttäneistä jälkielekäänsyä oli käyttänyt 1,5 %. E-pilleri oli yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen. Keskeytyksen jälkeen mitään ehkäisyä ei oltu suunniteltu tai suunnitellusta ehkäisystä ei ollut tietoa 8,2 %:lla.

Steriloinnit

Sterilointien määrä väheni edelleen (4 %) vuonna 2004. Naisten sterilointeja tehtiin noin 5 600 ja miesten sterilointeja runsaat 1 500. Naisten steriloinnit vähenivät noin 4 % ja miesten steriloinnit noin 3 %. Steriloinneista 78 % tehtiin naisille ja 22 % miehille vuonna 2004.

Yleisin steriloinnin peruste oli vähintään 30 vuoden ikä sekä miehillä (78 %) että naisilla (65 %). Väestöön suhteutettuna tehtiin 3,0 sterilointia tuhatta 25-54 -vuotiasta kohti, naisille merkittävästi enemmän (4,8) kuin miehille (1,3). Suurin osa naisten (41,0 %) ja miesten (30,5 %) steriloinneista tehdään 35-39 -vuotiaalle.

Väkilukuun suhteutettuna eniten sterilointeja tehtiin Lapin sairaanhoitopiirissä (4,8/1000) ja vähiten Pirkanmaalla (2,2/1000). Miesten sterilointeja tehtiin eniten Satakunnan sairaanhoitopiirissä (2,1/1000) ja vähiten Ahvenanmaalla (0,2/1000). Naisten sterilointeja tehtiin eniten Lapin sairaanhoitopiirissä (8,2/1000) ja vähiten Keski-Suomessa (2,9/1000).

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2004

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2004

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2004

Taulukko 4: Suoritettujen raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2004

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2004

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2004

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2004

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2004

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2004

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998-2004

Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2004

Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2004

Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004

Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004

Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2004

Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2004

Taulukko 17: Raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1987-2004

Taulukko 18: Raskaudenkeskeytys- ja steriloisimisrekisterin aikasarjoja, steriloinnit 1975, 1980, 1985, 1987-2004

Lähteet:

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisestä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970 ja Steriloimislaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkäriin on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-keskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloisimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954, Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970, Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin tietokannassa. Vuosien 1987-2001 aineistoa on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin tilastoihin mukaan ottamattomia tapauksia, myöhemmin ilmoitettuja, on tallennettu. Tämän vuoksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen vuotta 1994 ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät:

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjatkamiskyvyttömyyteen. Steriloimiseksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

Aborter och steriliseringar 2004

Aborter

Hanna Eronen
 +358 9 3967 2346

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279

E-post:
 fornamn.efternamn@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus-
 ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
 centralen för social- och
 hälsovården

National Research and
 Development Centre for Welfare
 and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
 ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

År 2004 utfördes 11 091 aborter, dvs. 9,4, per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Antalet aborter ökade med 3 procent, dvs. med drygt 300 aborter från året innan. Aborterna bland kvinnor under 20 år ökade med 1,5 procent jämfört med föregående år. Mest ökade antalet aborter i åldersgruppen 20–24 år (9,5 %). Även antalet i åldersgruppen 25–29 år ökade (4,7 %). Däremot minskade antalet aborter i åldersgruppen 30–39 år (3 %).

Antalet aborter på sociala indikationer fortsatte att öka. År 2004 utfördes 90,6 procent av aborterna på social indikation, dvs. på grund av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden och andra omständigheter. De övriga mest frekventa indikationerna var ålder under 17 år (6,4 %), över 40 år (3,7 %) och fyra tidigare förlossningar (2,1 %). På medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppsslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa, utfördes 0,4 procent av aborterna. Av alla aborter verkställdes 2,3 procent på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada. Antalet var ungefär detsamma som året innan.




Diagram 1: Aborter i åldrarna under 30 år efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar 2000–2004

År 2004 utfördes mest aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i Länsi-Pohja (11,1) och Helsingfors och Nylands ((10,9) sjukvårdsdistrikt. Antalet aborter var minst i Södra Österbotten (6,8) och Kaj-analand (7,1).

Andelen aborter före den sjätte graviditetsveckan (36,3 %) fortsatte att öka 2004. Största delen av aborterna (93,5 %) gjordes före den tolfte graviditetsveckan. Andelen medicinska (farmakologiska) aborter av alla aborter ökade således 35,9 procent. Av abortpatienterna hade 31,8 procent genomgått minst ett tidigare abortingrepp och 47,3 procent hade fött minst ett barn.

Av abortpatienterna uppgav 63,5 procent att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod och 2,1 procent att de använt akut p-piller. Andelen som använt akut p-piller minskade lite jämfört med året innan. Av abortpatienterna under 20 år hade 1,5 procent använt akut p-piller. P-piller var den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp. Efter aborten hade 8,2 procent av abortpatienterna ingen planerad preventivmetod eller inga kunskaper om någon sådan.

Steriliseringar

Antalet steriliseringar fortsatte minska (4 %) 2004. Totalt steriliserades cirka 5 600 kvinnor och drygt 1 500 män. Steriliseringarna av kvinnor minskade med cirka 4 procent och av män med ungefär 3 procent. Av steriliseringarna var 78 procent sterilisering av kvinnor och 22 procent av män år 2004.

Den vanligaste steriliseringsindikationen var både för män (78 %) och kvinnor (65 %) minst 30 års ålder. I relation till befolkningen utfördes 3,0 steriliseringar per 1 000 personer i åldern 25–54 år, avsevärt fler steriliseringar av kvinnor (4,8) än av män (1,3). Största delen av steriliseringarna av kvinnor (41,0 %) och av män (30,5 %) görs i åldersgruppen 35–39 år.

I relation till folkmängden gjordes flest steriliseringar i Lapplands sjukvårdsdistrikt (4,8/1 000) och minst i Birkaland (2,2/1 000). Mest steriliserades män i Satakunta sjukvårdsdistrikt (2,1/1 000) och minst på Åland (0,2/1 000). Kvinnor steriliserades mest i Lapplands sjukvårdsdistrikt (8,2/1 000) och minst i Mellersta Finland (2,9/1 000).

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2004

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2004

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2004

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2004

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2004

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2004

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2004

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2004

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2004

Tabell 10: Abortmetoder 1998–2004

Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951–2004

Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2004

Tabell 13: Steriliseringar av kvinnor efter åldersgrupp 1994–2004

Tabell 14: Steriliseringar av män efter åldersgrupp 1994–2004

Tabell 15: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2004

Tabell 16: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2004

Tabell 17: Tidsserier i abort- och steriliseringsregistret, aborter 1975, 1980, 1985, 1987–2004

Tabell 18: Tidsserier i abort- och steriliseringsregistret, steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987–2004

Källor:

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar, som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintölaivos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveysthuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna från 1987–2001 har granskats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har ingått i statistiken eftersom de har anmälts senare. Därför avviker en del av uppgifterna från den statistik som publicerats tidigare.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

Med **sterilisering** avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.

Induced abortions and sterilisations 2004

Induced abortions

Hanna Eronen
 +358 9 3967 2346

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279

Email:
 firstname.familyname@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus-
 ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
 centralen för social- och
 hälsovården

National Research and
 Development Centre for Welfare
 and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

In 2004, induced abortions totalled 11 091, which is 9.4 abortions per a thousand women of childbearing age (15–49 years). The increase on the previous year was 3 per cent or just over 300 abortions. Abortions among under-20s increased 1.5 per cent from the previous year. The greatest increase occurred in the 20–24 age group (9.5 per cent). In the 25–29 age group, the increase was 4.7 per cent. A decrease of 3 per cent occurred in the 30–39 age group.

The number of abortions on social grounds continued to increase. In 2004, 90.6 per cent of abortions were performed on social grounds, that is, the birth of the child would have caused considerable strain to the mother in view of her personal circumstances and living conditions. The other most common indications were the mother being under 17 (6.4 per cent), over 40 (3.7 per cent), or having given birth to four children (2.1 per cent). 0.4 per cent of abortions were performed on medical grounds, that is, the pregnancy would have endangered the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility. The proportion of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was 2.3 per cent of all abortions. The figure was almost the same as in the previous year.




Figure 1: Induced abortions among under-30s per 1000 women of same age, 2000–2004

An analysis by hospital district in 2004 shows that the greatest number of abortions per a thousand women of childbearing age were performed in the hospital districts of Länsi-Pohja (11.1) and that of Helsinki and Uusimaa (10.9). The lowest figures were found in Etelä-Pohjanmaa (6.8) and Kainuu (7.1).

The proportion of abortions before the 6th week of gestation (36.3 per cent) continued to increase in 2004. Most abortions were performed before the 12th week of gestation (93.5 per cent). The proportion of abortions induced by drugs increased, being 35.9 per cent of all induced abortions. 31.8 per cent of the patients had undergone at least one earlier induced abortion, and 47.3% had given birth at least once.

When the pregnancy started, 63.5 per cent of the abortion patients had used some contraceptive method. Post-coital oral contraceptive had been used by 2.1 per cent, representing a slight decrease on the previous year. Of under-20s, 1.5 per cent has used post-coital oral contraceptive. The most common planned contraceptive method after abortion was the pill. In 8.2 per cent of the cases, no contraceptive method had been planned after abortion or no data were available.

Sterilisations

Sterilisations continued to decrease (4 per cent) in 2004. Sterilisations of women totalled some 5600 and sterilisations of men just over 1500. The decrease for women was some 4 per cent, while sterilisations among men increased by some 3 per cent. In 2004, 78 per cent of the sterilisations were done on women and 22 per cent on men.

The age of 30 or over was the most common indication for sterilisation for both men (78 per cent) and women (65 per cent). In proportion to the population, 3.0 sterilisations were performed per a thousand persons in the 25–54 age group. Significantly more women (4.8) than men (1.3) were sterilised. The 35–39 age group accounts for a majority of sterilisations of both women (41.0 per cent) and men (30.5 per cent).

In proportion to the population, most sterilisations were performed in the hospital district of Lapland (4.8 per 1000) and fewest in Pirkanmaa (2.2 per 1000). The number of sterilisations of men was highest in the hospital district of Satakunta (2.1 per 1000) and lowest in Ahvenanmaa (0.2 per 1000). The number of sterilisations of women was highest in the hospital district of Lapland (8.2 per 1000) and lowest in Keski-Suomi (2.9 per 1000).

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975–2004

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2004

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2004

Table 4: Induced abortions by indication, 2004

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2004

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2004

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2004

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2004

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after the abortion 1983–2004

Table 10: Methods for induced abortion, 1998–2004

Table 11: Sterilisations by sex, 1951–2004

Table 12: Sterilisations by hospital district, 2004

Table 13: Sterilisations among women by age group, 1994–2004

Table 14: Sterilisations among men by age group, 1994–2004

Table 15: Sterilisations among women by indication, marital status, age and previous deliveries, 2004

Table 16: Sterilisations among men by indication, marital status and age, 2004

Table 17: Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, induced abortions 1975, 1980, 1985, 1987–2004

Table 18: Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, sterilisations 1975, 1980, 1985, 1987–2004

References:

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion is from 1970.

In accordance with current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970 and Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. Data for 1987–2001 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding cases that had arrived later and had not previously been included. For these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Concepts and definitions

Induced abortion: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2004

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2004

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2004

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyntyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾							
			Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	199,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 646	199,7	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 069	166,0	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 375	160,2	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 012	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 931	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 739	192,5	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 969	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1
2003	10 768	189,7	15,2	16,9	12,2	10,6	8,0	2,9	0,3	9,0
2004	11 091	192,7	15,7	18,4	12,6	10,6	7,9	3,1	0,2	9,4

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2004

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2004

Table 2. Abortions by hospital district and age 2004

Sairaanhoitopiiri ¹ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ²	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
	Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	17,4	22,0	14,0	12,0	9,5	4,0	0,3
- Uusimaa - Nyland	15,1	22,1	13,7	11,3	8,8	3,9	0,1	10,0
- Helsinki - Helsingfors	21,5	21,8	14,2	12,9	10,5	4,2	0,5	12,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	14,5	18,0	12,3	11,5	6,3	2,8	0,7	9,2
Satakunta - Satakunta	20,3	17,4	10,9	10,1	6,1	2,2	0,2	9,0
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	15,0	19,4	10,5	9,8	6,7	2,9	0,2	8,5
Pirkanmaa - Birkaland	14,0	15,1	11,1	8,5	7,6	2,8	0,3	8,3
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	14,8	23,2	13,6	11,7	8,6	2,4	0,4	9,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen	16,2	20,8	17,1	11,4	7,1	3,0	0,3	9,8
Etelä-Karjala - Södra Karelen	14,9	13,0	13,2	10,5	8,6	4,1	0,0	8,5
Etelä-Savo - Södra Savolax	17,0	15,7	10,8	8,7	6,4	1,7	0,0	7,8
Itä-Savo - Östra Savolax	17,3	13,4	12,3	9,5	4,5	2,7	0,0	7,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	15,6	16,5	12,5	9,4	6,1	1,9	0,1	8,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax	13,6	20,1	10,2	9,2	6,2	3,1	0,2	8,4
Keski-Suomi - Mellersta Finland	17,7	15,2	11,7	9,0	6,8	2,9	0,0	8,8
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	11,5	13,3	10,8	7,3	5,5	1,8	0,0	6,8
Vaasa - Vasa	9,6	11,7	8,6	9,0	9,2	3,8	0,2	7,3
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	15,6	12,3	9,9	6,4	6,1	2,0	0,0	7,5
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	14,1	15,8	12,7	10,2	7,5	3,0	0,2	9,0
Kainuu - Kajanaland	13,5	15,6	12,0	7,4	4,2	2,0	0,0	7,1
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	19,6	22,8	13,9	14,8	9,7	3,0	0,0	11,1
Lappi - Lappland	18,9	21,9	10,9	12,6	10,2	2,6	0,2	10,3
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	19,8	17,6	17,8	7,4	10,8	3,3	0,0	10,1
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	15,7	18,4	12,6	10,6	7,9	3,1	0,2	9,4

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2004, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2004, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970-2004, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	1,1	0,1	0,0	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	0,1	0,0	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	0,1	0,0	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	0,0	0,0	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	0,1	0,0	100	11 737
1992	0,8	76,0	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0	100	11 069
1993	0,6	73,7	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	80,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 931
2001	0,4	84,8	0,1	7,2	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 782 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,4	0,1	6,8	3,9	2,1	0,6	1,6	0,0	100	11 103 ⁽⁴⁾
2003	0,5	86,8	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,5	0,0	100	10 911 ⁽⁴⁾
2004	0,4	90,6	0,1	6,4	3,7	2,1	0,9	1,4	0,1	100	11 359 ⁽⁴⁾

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. *Under the current law.*

2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över total antalet. *Statistics on available total number only.*

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2004

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2004

Table 4: Abortions by indication 2004

Siviilisäätö, ikä ja syntytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar <i>Marital status, age and number of deliveries</i>	Peruste - Indikation - Indication									
	Läketiet. <i>Medical</i>	Sosiaalinen <i>Social</i>	Eettinen <i>Criminal</i>	Alle 17 v. <i>Age under 17</i>	Yli 40 vuotta <i>Age 40 or more</i>	4 lasta <i>4 children</i>	Mahdollinen sikiövaurio <i>Potential foetal defect</i>	Todettu sikiövaurio <i>Detected foetal defect</i>	Raj. kyky huolehtia lapsista <i>Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children</i>	Yhteensä ¹⁾ <i>Totalt Total</i>
Siviilisäätö - Civilstånd <i>- Marital status</i>										
Naimisissa - Gift - Married	15	1 796	1	2	185	122	51	75	1	2 248
Naimaton - Ogift - Single	23	7 208	5	653	106	56	41	66	5	8 163
Leski - Änka - Widowed	1	25	-	-	4	5	-	-	-	35
Eronnut - Fränskild - Divorced	4	771	-	-	85	36	5	8	1	910
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359
Ikä - Ålder - Age ²⁾										
-13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
14	1	-	-	50	-	-	-	-	-	51
15	-	1	-	184	-	-	-	-	-	185
16	-	17	-	335	-	-	-	-	-	352
17	-	470	-	81	-	-	1	-	-	552
18	1	635	1	-	-	-	1	1	-	639
19	2	727	1	-	-	-	-	-	1	731
20-24	7	2 951	2	-	-	6	8	2	-	2 976
25-29	8	1 938	1	-	-	40	28	18	1	2 034
30-34	9	1 489	-	-	-	58	22	34	3	1 615
35-39	12	1 286	1	-	-	75	25	36	2	1 437
40-44	3	271	-	-	349	35	11	34	-	703
45-49	-	17	-	-	31	5	1	23	-	77
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries										
0	18	5 147	4	652	49	-	39	55	3	5 967
1	12	1 890	1	3	72	-	31	54	2	2 065
2	8	1 841	1	-	142	-	17	25	2	2 036
3	3	743	-	-	72	6	4	8	-	836
4	1	136	-	-	30	148	5	4	-	324
5	-	29	-	-	11	49	1	1	-	91
6	1	11	-	-	2	9	-	2	-	25
7	-	4	-	-	1	3	-	-	-	8
8	-	1	-	-	1	3	-	-	-	5
9-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2004

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2004

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2004

	Raskauden kesto, viikkoja													Tuntematon	Yhteensä
	Gestationslängd, veckor														
	Gestation length, weeks														
	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-	Okänd		
												Unknown	Total		
1985	1 853	2 597	3 086	2 647	1 987	949	156	216	191	139	7	4	-	13 833	
1986	1 947	2 595	2 982	2 459	1 784	869	134	192	156	175	13	13	-	13 319	
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986	
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738	
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 798	858	144	221	152	157	17	16	4	12 646	
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217	
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	-	11 737	
1992	1 919	2 212	2 374	1 987	1 340	628	136	168	133	126	33	13	-	11 069	
1993	1 878	2 118	2 306	1 809	1 158	550	129	159	133	102	24	9	-	10 375	
1994	1 988	2 107	2 140	1 615	1 096	461	114	177	135	124	34	21	-	10 012	
1995	1 888	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	-	9 872	
1996	2 020	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 423	
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	1	10 250	
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 075	459	184	161	125	113	27	13	3	10 751	
1999	2 322	2 448	2 318	1 550	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 837	
2000	2 605	2 371	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	-	10 931	
2001	3 553	2 290	1 727	1 213	915	358	192	189	151	106	31	14	-	10 739	
2002	3 778	2 398	1 696	1 096	877	383	245	191	141	113	36	15	-	10 969	
2003	3 845	2 464	1 624	959	783	377	207	190	151	103	42	23	1	10 768	
2004	4 025	2 483	1 712	992	738	407	226	226	146	86	27	23	-	11 091	
%															
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	-	100	
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	-	100	
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100	
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100	
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100	
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	-	100	
1992	17,3	20,0	21,4	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	-	100	
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	-	100	
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	-	100	
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	-	100	
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100	
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100	
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100	
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	-	100	
2001	33,1	21,3	16,1	11,3	8,5	3,3	1,8	1,8	1,4	1,0	0,3	0,1	-	100	
2002	34,4	21,9	15,5	10,0	8,0	3,5	2,2	1,7	1,3	1,0	0,3	0,1	-	100	
2003	35,7	22,9	15,1	8,9	7,3	3,5	1,9	1,8	1,4	1,0	0,4	0,2	0,0	100	
2004	36,3	22,4	15,4	8,9	6,7	3,7	2,0	2,0	1,3	0,8	0,2	0,2	-	100	

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2004

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2004

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2004

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
<i>Previous deliveries</i>								
	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 595	1 957	2 171	945	239	94	11	10 012
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000	5 672	1 902	2 064	938	270	85	-	10 931
2001	5 496	1 962	2 011	913	249	107	1	10 739
2002	5 740	1 955	2 024	885	271	94	-	10 969
2003	5 685	1 919	1 925	880	256	103	-	10 768
2004	5 881	2 039	2 010	818	247	96	-	11 091
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004	53,0	18,4	18,1	7,4	2,2	0,9	-	100

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2004

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2004

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2004

Aikaisemmat keskeytykset								
Tidigare aborter								
<i>Previous abortions</i>								
	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
1987	9 454	2 528	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 930	2 132	602	142	44	28	134	10 012
1995	6 912	2 154	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 248	2 273	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 263	641	182	58	27	-	10 751
1999	7 776	2 184	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 769	2 257	649	172	55	29	-	10 931
2001	7 597	2 249	621	189	48	33	2	10 739
2002	7 702	2 274	686	218	49	38	2	10 969
2003	7 357	2 385	699	197	85	45	-	10 768
2004	7 566	2 396	788	229	66	45	1	11 091
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,0	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,1	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,1	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,1	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,1	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,1	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,1	-	100
1999	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,3	0,0	100

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2004, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2004, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2004, %

	Pilleri ¹⁾ P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiräl Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Jälkiehkäisy ²⁾ Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,8	35,7	4,8	1,5	104,5
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,5	5,9	2,3	105,2
2004	9,8	0,2	1,0	46,7	0,3	3,4	36,4	4,4	2,1	104,3

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämns. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en metod möjlig. More than one method possible.

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2004, %

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983-2004, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983-2004, %

	Pilleri ¹⁾ P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiräl Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1983	33,1	0,0	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100
1984	29,2	0,0	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100
1985	26,5	0,0	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100
1986	51,1	0,0	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100
1987	53,0	0,0	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100
1988	56,1	0,0	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100
1989	57,7	0,0	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100
1990			20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100
1991	54,8	0,0	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100
1992	54,9	0,0	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100
1993	57,0	0,0	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100
1994	57,4	0,0	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100
1995	56,6	0,0	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100
1996	53,7	0,0	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100
1997	57,6	0,0	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,8	100
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100
2004	53,6	10,1	11,5	3,7	3,8	11,8	1,2	7,0	100

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000-2004

Tabell 10: Abortmetoder 2000-2004

Table 10: Methods for induced abortion 2000-2004

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisimu	Aborttiivaine	Prostaglandiini tai muu lääke	Mifegyne	Keisari- leikkaus	Muu	Tuntematon	Yhteensä
	Utvidgning, utrymning med sug	utrymning, utrymning med sug	Tidig utrymning med sug	Abortiv- medel	Prostaglandin eller annat läkemedel	Mifegyne	Kejsarsnitt	Annat	Okänd	Totalt
	<i>Dilation, suction currettage</i>	<i>Dilation, evacuation, suction currettage</i>	<i>Early suction</i>	<i>Abortion agent</i>	<i>Prostaglandin or other drug</i>	<i>Mifegyne</i>	<i>Caesarean section</i>	<i>Other</i>	<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
2000	9 227	338	191	481	348	333	3	10	-	10 931
2001	7 203	230	159	518	838	1 758	5	28	-	10 739
2002	6 011	138	142	603	965	3 099	3	8	-	10 969
2003	5 006	112	104	658	1349	3 532	2	5	-	10 768
2004	4 560	120	82	682	1649	3 986	2	9	1	11 091
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
2001	67,1	2,1	1,5	4,8	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	8,8	28,3	0,0	0,1	-	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	12,5	32,8	0,0	0,0	0,0	100
2004	41,1	1,1	0,7	6,1	14,9	35,9	0,0	0,1	0,0	100
Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week										
2000	9 138	284	191	14	295	333	-	4	-	10 259
2001	7 119	195	159	22	797	1 756	-	8	-	10 056
2002	5 950	109	142	15	911	3 098	-	3	-	10 228
2003	4 962	87	104	17	1 348	3 532	-	2	-	10 052
2004	4 522	95	82	17	1 649	3 986	1	4	1	10 357
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	-	0,0	-	100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	-	0,1	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	8,9	30,3	-	0,0	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	13,4	35,1	-	0,0	-	100
2004	43,7	0,9	0,8	0,2	15,9	38,5	-	0,0	0,0	100
13. viikolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter										
2000	89	54	0	467	53	-	3	6	-	672
2001	84	35	0	496	41	2	5	20	-	683
2002	61	29	0	588	54	1	3	5	-	741
2003	44	25	0	641	1	-	2	3	-	716
2004	38	25	0	665	-	-	1	5	-	734
%										
2000	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	-	0,4	0,9	-	100
2001	12,3	5,1	0,0	72,6	6,0	0,3	0,7	2,9	-	100
2002	8,2	3,9	0,0	79,4	7,3	0,1	0,4	0,7	-	100
2003	6,1	3,5	0,0	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
2004	5,2	3,4	-	90,6	-	-	0,1	0,7	-	100

Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2004

Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951-2004

Table 11: Sterilisations by sex 1951-2004

Vuosi	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	
År	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	
Year	Women	Men	Total	Women	Men	Total	Women	Men	Total	
N				%				Per 1000 25-54 v. / år / year		
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5	
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6	
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6	
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6	
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7	
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9	
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0	
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3	
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5	
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9	
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9	
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0	
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1	
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0	
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9	
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1	
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4	
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5	
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2	
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4	
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5	
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1	
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7	
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3	
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3	
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1	
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1	
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2	
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2	
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5	
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8	
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3	
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5	
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8	
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4	
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0	
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0	
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8	
1989	12 392	611	13 003	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0	
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1	
1991	12 782	512	13 294	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0	
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7	
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1	
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1	
1995	10 521	792	11 313	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0	
1996	12 561	1 810	14 371	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3	
1997	10 992	2 202	13 194	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8	
1998	9 594	1 921	11 515	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1	
1999	9 040	1 798	10 838	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8	
2000	8 699	1 772	10 471	83,1	16,9	100	7,9	1,6	4,7	
2001	7 262	1 766	9 028	80,4	19,6	100	6,6	1,6	4,0	
2002	6 725	1 594	8 319	80,8	19,2	100	6,2	1,4	3,8	
2003	5 905	1 642	7 547	78,2	21,8	100	5,5	1,5	3,4	
2004	5 652	1 595	7 247	78,0	22,0	100	4,8	1,3	3	

Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2004

Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2004

Table 12: Sterilisations by hospital district 2004

Sairaanhoitopiiri ¹⁾

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations					
	Naiset-Kvinnor-Women		Miehet-Män-Men		Yhteensä-Totalt-Total	
	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾
Koko maa	5 652	4,8	1595	1,3	7 247	3,0
- Hela landet - <i>Whole country</i>						
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	1 267	3,5	433	1,2	1 700	2,4
- Uusimaa - Nyland	945	4,5	308	1,4	1 253	3,0
- Helsinki - Helsingfors	322	2,1	125	0,9	447	1,5
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	551	5,3	131	1,2	682	3,3
Satakunta - Satakunta	223	4,7	105	2,1	328	3,4
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	180	5,0	51	1,4	231	3,2
Pirkanmaa - Birkaland	360	3,4	117	1,1	477	2,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	324	7,3	27	0,6	351	3,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen	259	7,0	66	1,6	325	4,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen	183	6,9	38	1,3	221	3,9
Etelä-Savo - Södra Savolax	88	4,2	25	1,1	113	2,6
Itä-Savo - Östra Savolax	99	7,9	10	0,7	109	4,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	266	7,4	70	1,8	336	4,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax	269	5,0	67	1,2	336	3,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland	174	2,9	126	2,0	300	2,5
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	208	5,1	55	1,3	263	3,1
Vaasa - Vasa	149	4,2	35	0,9	184	2,5
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	103	6,3	27	1,5	130	3,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	470	5,4	120	1,3	590	3,3
Kainuu - Kajanaland	109	6,4	15	0,8	124	3,5
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	112	8,0	23	1,5	135	4,6
Lappi - Lappland	216	8,2	46	1,6	262	4,8
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	40	6,9	1	0,2	41	3,5
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	-	-	2	0,0	2	0,0
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	2	0,0	5	0,0	7	0,0

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti.** Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år

Per 1000 women/men aged 25-54 years

Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004

Tabell 13: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994-2004

Table 13: Sterilisations by age group among women 1994-2004

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23	24	21
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201	182	180
30-34	2 485	2 387	2 766	2 412	2 056	2 022	1 771	1 469	1 333	1 116	989
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 656	3 579	2 865	2 762	2 369	2316
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 383	2 107	1 924	1886
45-49	579	566	643	527	489	398	409	309	295	286	255
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	-	4	5
Tuntematon - Okänd	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-
<i>Unknown</i>											
Yhteensä - Totalt	10 926	10 521	12 561	10 992	9 596	9 040	8 699	7 262	6 725	5 905	5652
<i>Total</i>											
%											
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8	18,9	17,5
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,5	41,1	40,1	41,0
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3	32,6	33,4
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4	4,8	4,5
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1
Tuntematon - Okänd	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-
<i>Unknown</i>											
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>											
Per 1000											
25-29	2,4	2,2	2,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1
30-34	13,3	12,8	14,9	13,1	11,3	11,4	10,3	8,8	8,3	7,2	6,6
35-39	22,2	21,1	26,1	22,8	20,2	19,6	19,2	15,5	15,0	13,0	13,0
40-44	15,6	15,7	18,8	17,3	15,1	13,9	14,0	12,7	11,3	10,3	10,1
45-49	2,8	2,7	3,0	2,5	2,4	2,0	2,1	1,6	1,5	1,5	1,3
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,4	5,3

Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004

Tabell 14: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994-2004

Table 14: Sterilisations among men by age group 1994-2004

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5	3	2
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34	26	22
30-34	107	147	328	415	347	336	309	290	298	258	248
35-39	199	271	575	704	615	575	596	557	507	553	486
40-44	152	204	496	604	555	491	506	529	440	463	475
45-49	86	108	266	319	263	241	230	240	215	242	249
50-54	37	45	100	129	102	122	99	102	94	97	113
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Unknown</i>											
Yhteensä - Totalt	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 594	1642	1595
<i>Total</i>											
%											
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1	1,6	1,4
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,4	18,7	15,7	15,5
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,6	31,5	31,8	33,7	30,5
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,6	30,0	27,6	28,2	29,8
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,6	13,5	14,7	15,6
50-54	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,8	5,9	5,9	7,1
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
<i>Unknown</i>											
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>											
Per 1000											
25-29	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
30-34	0,5	0,8	1,7	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6
35-39	1,0	1,4	3,0	3,6	3,2	3,0	3,1	2,9	2,6	2,9	2,6
40-44	0,7	1,0	2,4	3,0	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5
45-49	0,4	0,5	1,2	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
50-54	0,3	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5

Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2004

Tabell 15: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2004

Table 15: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among women 2004

	Synnyttänyt 3 lasta	3 alaikäistä lasta	Yli 30 vuotta Över 30 år	Lääketiet. Medicinsk	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn	Tuntematon Okänd	Yhteensä ¹⁾ Totalt
	Fött 3 barn Given birth to 3 children	3 minder- åriga barn 3 children under 18 yrs	Age 30 or more	Medical	Difficulties in contra- ception	Serious disease or defect of offspring	Limited ability to take care of children	Unknown	Total
Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status									
Naimisissa - Gift - Married	1 857	121	3 482	20	156	1	1	0	5 638
Naimaton - Ogift - Single	390	16	1 186	11	76	1	8	0	1 688
Leski - Änka - Widowed	20	1	34	0	4	0	0	0	59
Eronnut - Fränskild - Divorced	305	23	737	3	46	0	0	0	1 114
Tuntematon - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikä - Ålder - Age²⁾									
-19	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20-24	9	2	0	5	3	0	4	0	23
25-29	141	11	0	15	25	2	4	0	198
30-34	564	36	987	7	51	0	0	0	1 645
35-39	1 095	74	2 308	7	111	0	0	0	3 595
40-44	681	37	1 884	0	86	0	0	0	2 688
45-49	81	1	255	0	6	0	0	0	343
50-	1	0	5	0	0	0	0	0	6
Tuntematon - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries									
0	0	0	274	4	22	1	7	0	308
1	1	1	579	2	33	1	1	0	618
2	50	13	2 214	22	131	0	1	0	2 431
3	1 618	86	1 520	3	65	0	0	0	3 292
4	618	36	579	1	18	0	0	0	1 252
5	176	15	166	0	9	0	0	0	366
6	69	6	67	2	3	0	0	0	147
7	25	2	25	0	1	0	0	0	53
8	6	1	6	0	0	0	0	0	13
9-	9	1	9	0	0	0	0	0	19
Tuntematon - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä - Totalt - Total	2 572	161	5 439	34	282	2	9	0	8 499

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2004

Tabell 16: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2004

Table 16: Sterilisations by indication, marital status and age among men 2004

	3 alaikäistä lasta 3 minder- åriga barn 3 children under 18 yrs	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 or more	Lääketiet. Medicinsk Medical	Ehkäisy- vaikkeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status								
Naimisissa - Gift - <i>Married</i>	311	1 223	0	50	0	0	0	1 584
Naimaton - Ogift - <i>Single</i>	31	160	0	10	0	1	0	202
Leski - Änka - <i>Widowed</i>	1	3	0	0	0	0	0	4
Eronnut - Frånskild - <i>Divorced</i>	34	182	0	5	0	0	0	221
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	1	2	0	0	0	0	0	3
Ikä - Ålder - Age ²⁾								
-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	2	0	0	1	0	0	0	3
25-29	19	0	0	2	0	1	0	22
30-34	65	248	0	11	0	0	0	324
35-39	133	485	0	19	0	0	0	637
40-44	106	475	0	20	0	0	0	601
45-49	36	249	0	11	0	0	0	296
50-	17	113	0	1	0	0	0	131
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä								
- Totalt - <i>Total</i>	378	1 570	0	65	0	1	0	2 014

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*

Taulukko 17. Raskaudenkeskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1987-2004
 Tabell 17. Register over aborter og steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004
 Table 17. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for abortions 1975, 1980, 1985, 1987-2004

RASKAUDENKESKEYTYKSET / ABORTER / INDUCED ABORTIONS	1975	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Keskeytyksiä / Aborter / Abortions	21547	15037	9871	12986	12738	12646	12217	11737	11069	10375	10012	9872	10423	10250	10751	10837	10931	10739	10969	10768	11091	
tuhatta 15-49 v. naista kohden /per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år /per 1000 women aged 15-49	17,9	12,3	11,0	10,3	10,2	10,1	9,7	9,3	8,7	8,1	7,9	7,8	8,3	8,2	8,7	8,8	9,0	8,8	9,1	9,0	9,4	
tuhatta elävänä syntynyttä kohden /per 1 000 levande födda /per 1000 live births	327,9	238,4	220,3	217,4	201,6	199,7	186,6	179,7	166,0	160,2	154,3	157,1	172,3	173,6	189,3	188,6	193,3	191,8	196,3	189,7	192,7	
Ikä / Alder / Age %																						
< 20 v / å / y	19,2	24,1	25,8	21,4	20,0	19,5	18,8	17,2	17,1	16,5	17,1	17,9	17,4	18,7	19,5	21,1	22,0	23,2	23,6	22,4	22,0	
20-24 v / å / y	24,7	24,5	23,7	25,8	27,4	26,0	25,6	24,8	23,8	22,9	21,6	21,9	21,7	21,9	22,1	23,1	23,4	22,4	24,1	25,3	26,9	
25-34 v / å / y	35,1	31,7	29,5	30,7	31,2	32,9	34,0	36,0	37,7	39,9	41,6	40,7	41,7	40,4	39,1	36,7	35,5	35,2	33,4	33,3	32,7	
≥ 35 v / å / y	20,9	19,8	20,8	22,0	21,5	21,6	21,6	22,0	21,3	20,8	19,7	19,5	19,2	19,1	19,3	19,1	19,1	19,2	18,8	19,0	18,4	
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																						
15-19 v / å / y	21,2	19,4	16,5	18,3	17,4	17,3	15,9	13,9	12,9	11,2	10,7	11,0	11,4	12,0	13,0	14,1	14,8	15,4	16,1	15,2	15,7	
20-24 v / å / y	26,0	19,7	19,5	18,3	19,5	18,5	18,3	17,6	16,5	15,6	14,5	14,6	15,1	14,5	14,9	15,6	15,9	15,0	16,4	16,9	18,4	
25-29 v / å / y	22,0	12,2	11,8	11,7	12,0	12,8	12,6	13,1	12,7	12,6	13,0	12,9	13,8	13,6	13,9	13,7	13,0	13,1	12,4	12,2	12,6	
30-34 v / å / y	17,5	11,0	9,9	9,3	9,0	9,4	9,7	9,7	9,8	9,6	10,0	9,6	11,0	10,9	11,8	11,0	11,2	10,7	10,7	10,6	10,6	
35-39 v / å / y	17,1	10,3	9,3	8,2	8,0	7,8	7,6	7,7	7,2	7,0	6,3	6,6	7,1	7,1	7,7	7,7	7,9	7,5	7,6	8,0	7,9	
40-44 v / å / y	13,4	8,2	6,6	5,5	4,9	4,9	4,6	4,2	3,7	3,2	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3	2,9	3,1	
45-49 v / å / y	1,7	1,7	1,2	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,8	0,2	0,3	0,2	
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösningar / Previous deliveries %																						
0	45,8	51,8	50,2	49,8	51,4	50,7	50,3	48,6	48,2	46,6	45,9	47,5	46,8	48,7	48,8	50,2	51,9	51,2	52,3	52,8	53,0	
1	18,8	16,4	16,2	16,9	17,0	17,3	17,3	18,3	19,3	19,6	19,6	19,3	19,1	17,9	18,5	18,0	17,4	18,3	17,8	17,8	18,4	
2+	35,3	31,8	33,2	33,3	31,6	32,0	32,4	33,1	32,5	33,8	34,5	33,2	34,1	33,4	32,7	31,8	30,7	30,5	29,9	29,4	28,6	
Aiempiä keskeytyksiä / Tidigare aborter / Previous abortions %																						
0	-	-	71,5	72,8	73,2	72,4	72,9	71,0	69,6	69,3	69,2	70,0	69,5	70,0	70,5	71,8	71,1	70,8	70,3	68,3	68,2	
1	-	-	18,5	19,5	19,5	20,0	20,3	21,1	22,2	22,1	21,3	21,9	21,8	21,3	21,1	20,1	20,6	21,0	20,7	22,1	21,6	
2+	-	-	5,3	7,7	7,3	7,6	6,8	7,9	8,2	8,6	9,5	8,1	8,7	8,7	8,4	8,1	8,3	8,2	9,0	9,6	10,2	
Keskeytyksen peruste / Indikation för abort / Indication for induced abortion % 2)																						
sosiaalinen / social / social	74,8	77,6	82,9	83,4	84,4	84,0	83,9	84,3	85,2	85,5	85,5	86,2	86,8	86,9	85,8	85,8	84,3	84,8	86,3	86,8	90,6	
nainen / kvinna / woman < 17 v / å / y	5,2	7,5	5,5	4,8	4,1	4,0	4,5	4,4	4,3	4,2	3,8	3,9	3,7	4,6	5,4	6,1	7,5	7,1	6,8	6,7	6,4	
≥ 40 v / å / y	7,8	7,6	6,2	7,1	7,2	7,7	7,4	7,3	6,3	6,1	6,0	5,4	4,7	4,5	4,2	4,2	3,9	4,2	3,9	3,6	3,7	
synnyttänyt vähintään 4 lasta / fött minst 4 barn / given birth to at least 4 children	4,8	2,2	2,1	1,8	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	2,0	2,0	2,3	2,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,1	2,0	2,1	
sikiövaurio / fosterskada / foetal defect	1,1	1,0	0,6	0,1	1,1	1,4	1,5	1,4	1,7	1,6	2,2	2,1	2,1	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,0	2,3	2,3	
muut perusteet / andra indikationer / other indications 1)	6,3	4,1	2,7	2,8	1,6	1,2	0,9	0,9	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	
Raskauden kesto / gestationslängd / gestation length %																						
< 8 rvk / gv / gwk	-	-	32,2	31,9	32,7	32,8	33,3	36,2	37,3	38,6	40,8	40,7	40,3	41,9	43,8	44,0	45,5	54,6	56,6	58,9	58,7	
8-11 rvk / gv / gwk	-	-	62,7	62,8	62,0	61,7	61,2	58,3	57,2	56,2	53,0	53,2	53,8	52,3	50,4	50,0	48,3	39,3	37,0	34,9	34,7	
> 12 rvk / gv / gwk	-	-	5,1	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	6,2	6,1	5,9	5,8	5,8	6,0	6,2	6,1	6,4	6,2	6,5	
> 20+0 rvk / gv / gwk	-	-	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	
Sterilointi keskeytyksen yhteydessä / Sterilisering i anslutning till abort / Sterilisation done alongside abortion, %	3,0	0,0	5,8	4,3	4,8	4,6	4,3	4,5	4,1	4,7	4,7	4,3	4,7	4,2	4,2	4,0	2,9	2,0	1,9	1,2	1,0	
Lääkkeellinen keskeytys / Mifegyne / Mifegyne, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	16,4	28,3	32,8	35,9
Yli 20 rvk:n keskeytykset / Aborter efter graviditetsv. 20 / Abortions after 20th week of gestation	-	-	10	39	49	33	54	43	46	33	55	43	35	35	40	38	33	43	45	65	50	
Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy / Preventivemedel använda av abortpatienter / Contraceptives used by abortion patients																						
pilleri / p-piller / pill	4,6	5,9	7,1	7,6	7,9	7,7	8,3	8,1	7,8	7,1	7,8	7,4	7,8	7,2	7,9	8,5	8,6	9,1	9,8	9,8		
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing IUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	
kierukka / spiral / IUD	10,9	8,0	7,0	5,6	5,1	5,2	4,6	4,8	3,8	3,5	3,1	2,4	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0		
kondomi / kondom / condom	41,8	41,6	46,1	46,1	46,0	45,7	44,1	46,9	47,3	47,1	47,7	49,1	49,9	50,0	50,5	49,7	50,0	49,9	47,8	46,7		
sterilointi / sterilisering / sterilisation	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3		
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivemedel / other contraceptive	5,0	6,1	4,9	4,7	4,0	3,9	3,9	3,3	2,8	2,7	3,2	2,9	3,1	2,2	1,9	1,9	1,7	1,8	2,4	3,4		
ei mitään / ingenting / none	32,2	33,5	33,8	34,7	35,8	35,6	36,7	34,5	34,0	35,9	34,4	33,6	32,8	35,1	35,1	35,5	35,7	35,6	35,5	36,4		
tuntematon / okänt / unknown	5,4	4,9	3,9	4,0	6,2	6,8	7,1	6,9	8,0	8,6	8,9	8,6	8,9	7,4	6,8	7,1	5,0	5,9	8,4	4,4		
jälkiehkäisy / akut p-piller / post-coital oral contraceptive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	0,9	1,2	1,5	2,3	2,1	
< 20 v. jotka eivät ole käyttäneet ehkäisyä / < 20 år som inte använt något preventivemedel / aged under 20 with no contraceptive method, %	41,3	41,6	41,6	43,3	41,6	45,6	42,1	39,9	42,3	40,1	38,6	38,2	41,5	39,7	41,1	39,8	39	38,4	36,1			
Suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen / Preventivemedel planerad för abortpatienter / Contraceptives planned for abortion patient																						
pilleri / p-piller / pill	26,5	51,1	55,5	57,2	57,0	54,3	54,5	56,5	56,9	56,4	53,7	57,2	58,4	59,3	61,8	60,9	60,5	57,6	53,6			
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing IUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	5,4	6,9	7,1	8,0	8,9	10,1	
kierukka / spiral / IUD	48,0	23,6	21,6	19,3	20,1	22,3	24,2	22,5	21,7	21,8	22,8	21,5	15,3	14,9	13,4	14,0	12,5	11,8	11,5			
kondomi / kondom / condom	2,2	2,7	2,9	3,1	2,5	2,6	2,9	2,6	2,6	3,1	3,5	3,2	4,2	3,7	3,4	3,5	3,6	3,3	3,7			
sterilointi / sterilisering / sterilisation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,9	7,9	8,0	8,1	8,9	7,8	8,2	7,1	6,1	5,9	5,6	4,3	3,8			
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivemedel / other con.	12,0	11,9	10,9	11,1	10,5	10,4	2,7	1,3	1,1	0,8	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	1,0	7,				

Taulukko 18. Raskaudeneskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, sterilisointi 1975, 1980, 1985, 1987-2004
 Tabell 18. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004
 Table 18. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for sterilisations 1975, 1980, 1985, 1987-2004

STERILOINNIT	1975	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sterilointeja / Steriliseringar / Sterilisa	2 431	2 935	9 233	12 798	12 551	13 017	13 480	13 313	12 767	11 565	11 527	11 313	14 410	13 212	11 516	10 838	10 470	9 024	8 316	7 547	7 247
NAISET / KVINNOR / WOMEN																					
sterilointeja / steriliseringar / sterilisations	2 277	2 747	8 675	12 103	11 962	12 406	12 887	12 801	12 262	11 085	10 929	10 521	12 600	11 010	9 595	9 040	8 699	7 262	6 725	5 905	5 652
osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations	93,7	93,6	94,0	94,6	95,3	95,3	95,6	96,2	96,0	95,8	94,8	93,0	87,4	83,3	83,3	83,4	83,1	80,5	80,9	78,2	78,0
tuhatta 25-54 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 25-54 år / per 1000 women aged 25-54	2,3	2,8	8,4	11,5	11,3	11,6	11,9	11,7	11,2	10,0	9,8	9,5	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	4,8
Ikä / Alder / Age %																					
< 25 v / å / y	6,3	2,4	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
25-34 v / å / y	37,3	38,7	29,7	28,0	28,9	27,1	26,1	26,0	25,6	27,0	26,7	26,3	25,7	25,1	24,8	25,3	23,4	23,1	22,8	22,0	20,7
35-44 v / å / y	48,0	50,6	67,9	67,8	67,3	68,9	69,9	69,1	69,2	67,5	67,7	67,9	68,8	69,7	69,8	69,9	71,5	72,3	72,4	72,7	74,4
≥ 45 v / å / y	2,1	1,9	1,9	3,5	3,3	3,6	3,5	4,5	4,9	5,2	5,4	5,4	5,2	4,9	5,1	4,4	4,8	4,3	4,4	4,9	4,6
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women ⁸⁾																					
< 25 v / å / y	0,8	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25-34 v / å / y	2,4	2,8	0,4	9,0	9,2	9,0	9,0	9,0	8,5	8,1	8,0	7,8	9,3	8,1	7,2	7,1	6,4	5,3	4,9	4,2	3,8
35-44 v / å / y	4,2	4,9	1,0	20,7	19,9	20,7	21,8	21,6	20,9	18,8	18,9	18,4	22,4	20,1	17,6	16,8	16,6	14,1	13,2	11,7	11,5
45-54 v / å / y	0,2	0,2	0,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösningsar / Previous deliveries % ⁴⁾																					
0	4,0	3,5	2,1	2,6	2,8	2,7	2,5	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	3,7	3,6	3,7	4,2	4,3	4,8	4,6	4,6	5,1
1-2	34,6	43,6	49,0	56,4	55,2	56,2	55,8	56,0	54,7	53,6	52,9	52,8	54,1	53,6	53,3	52,3	52,0	49,9	50,5	51,0	50,1
3-4	46,6	46,1	44,0	38,2	38,9	38,3	38,8	38,4	39,1	39,5	40,2	39,9	38,8	39,2	39,0	39,5	39,8	41,0	40,0	39,9	39,7
5+	14,5	6,8	5,0	2,8	3,0	2,8	2,8	2,6	3,1	3,6	3,7	3,8	3,3	3,4	3,9	4,0	3,8	4,1	4,7	4,1	4,9
Steriloinnin peruste / Indikation för sterilisering / Indication for sterilisation, % ⁴⁾⁵⁾																					
≥ 30 v / å / y	- ¹⁾	- ¹⁾	47,5	68,2	68,2	68,9	68,7	69,0	68,3	68,2	67,6	67,8	68,9	68,4	67,9	67,7	68,0	65,3	65,6	65,0	64,0
synnättänyt 3 lasta / fött 3 barn / given birth to 3 children ²⁾			4,3	30,3	30,7	30,2	30,4	30,1	30,7	31,1	31,6	31,6	30,5	30,8	31,5	31,5	31,5	31,2	31,0	30,2	30,3
muut perusteet / andra indikationer / other indications 1) ²⁾			23,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5
3 alaikäistä lasta / 3 omyndiga barn / 3 children under 18 yrs ²⁾			0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1,2	1,9
ehkäisyvaikeudet / svårt att förhindra graviditet / difficulties in contraception ²⁾			25,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	2,2	2,2	3,2	3,3
MIEHET / MÄN / MEN																					
sterilointeja / steriliseringar / sterilisations	154	188	558	695	589	611	593	512	505	480	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 771	1 762	1 591	1 642	1 595
osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations	6,3	6,4	6,0	5,4	4,7	4,7	4,4	3,8	4,0	4,2	5,2	7,0	12,6	16,7	16,7	16,6	16,9	19,5	19,1	21,8	22,0
tuhatta 25-54 v. miestä kohden / per 1 000 män i åldern 25-54 år / per 1000 men aged 25-54 years	0,2	0,2	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3
Ikä / Alder / Age %																					
< 25 v / å / y	3,9	1,6	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
25-34 v / å / y	46,1	47,3	27,6	29,6	23,4	23,1	22,6	18,6	19,8	24,2	20,7	20,7	20,4	20,2	19,7	20,5	19,0	19,0	20,9	17,3	16,9
35-44 v / å / y	40,9	42,0	59,5	58,0	65,0	64,8	61,6	65,6	65,0	57,3	58,7	60,0	59,2	59,4	60,9	59,3	62,2	61,6	59,5	61,9	60,3
≥ 45 v / å / y	-	-	12,9	12,2	11,4	11,8	15,5	15,7	15,2	18,3	20,6	19,3	20,2	20,3	19,0	20,2	18,6	19,2	19,3	20,5	22,7
Ikäryhmittäin 1000 miestä kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 män / By age group per 1000 men ⁸⁾																					
< 25 v / å / y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 v / å / y	0,2	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
35-44 v / å / y	0,2	0,3	0,8	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	1,2	2,7	3,3	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	2,7	2,5
45-54 v / å / y	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Steriliseringar per 1 000 kvinnor/män i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Sterilisations per 1000 women/men of the same age by hospital district ⁴⁾																					
HUS	-	-	- ³⁾	- ³⁾	4,7	4,5	3,9	3,7	4,0	4,0	4,8	4,2	3,8	3,8	3,7	3,1	2,8	2,3	2,3	2,4	2,4
Helsinki / Helsingfors	-	-	-	2,1	2,1	2,1	3,5	3,2	3,0	2,4	2,7	2,4	3,4	2,5	2,3	2,9	2,7	2,0	1,6	1,2	3,0
Uusimaa / Nyland	-	-	- ³⁾	- ³⁾	5,5	5,5	4,6	4,6	4,8	5,1	5,8	5,4	4,8	4,4	4,3	3,9	3,7	3,1	1,5		1,5
Varsinais-Suomi / Egentliga Finland	-	-	-	3,6	3,4	3,4	7,4	7,2	7,7	6,6	6,2	6,2	7,0	6,5	5,6	5,9	6,1	4,2	4,3	4,2	3,3
Satakunta / Satakunta	-	-	-	2,4	2,5	2,6	5,4	5,6	5,9	4,4	4,5	4,0	7,6	6,0	5,3	5,1	5,2	4,1	3,5	4,0	3,4
Kanta-Häme / Centrala Tavastland	-	-	-	2,8	3,0	3,8	7,8	6,4	4,9	5,0	6,0	4,8	6,6	6,0	6,1	6,0	4,5	4,6	4,6	3,6	3,2
Pirkanmaa / Birkaland	-	-	-	2,6	2,5	2,6	6,1	6,5	6,3	4,8	4,4	4,5	6,6	6,1	4,7	4,9	5,0	4,3	3,4	3,2	2,2
Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland	-	-	-	3,9	3,7	3,4	6,5	6,9	6,8	6,8	5,3	4,9	6,1	6,4	7,0	5,7	4,5	3,3	3,1	3,4	3,9
Kymenlaakso / Kymmenedalen	-	-	-	2,3	2,0	2,5	7,3	7,5	5,0	4,7	5,5	5,4	5,5	5,8	5,2	5,0	4,6	5,1	4,2	4,6	4,2
Etelä-Karjala / Södra Karelen	-	-	-	2,6	2,9	2,8	6,0	7,2	5,2	4,7	5,4	5,4	6,0	6,4	7,3	5,5	5,3	4,8	4,3	5,6	3,9
Etelä-Savo / Södra Savolax	-	-	-	2,4	2,1	2,6	5,8	6,1	5,3	5,4	4,4	5,0	5,1	5,2	4,7	4,7	4,8	3,8	3,4	3,9	2,6
Itä-Savo / Östra Savolax	-	-	-	2,3	2,5	2,4	6,2	6,4	6,6	5,8	4,4	5,0	7,7	7,4	4,9	5,5	4,8	4,0	3,8	4,5	4,2
Pohjois-Karjala / Norra Karelen	-	-	-	2,7	2,9	3,1	7,9	7,5	8,8	7,2	6,1	6,2	7,3	6,6	4,4	4,1	4,1	4,9	4,1	4,7	4,5
Pohjois-Savo / Norra Savolax	-	-	-	3,4	3,0	2,6	7,8	7,8	5,8	5,4	5,2	4,3	6,7	6,0	5,1	4,1	5,3	4,6	4,0	4,3	3,0
Keski-Suomi / Mellersta Finland	-	-	-	2,6	2,7	2,5	6,4	5,9	5,7	4,7	5,9	5,7	7,7	7,5	5,7	5,0	5,1	4,0	4,1	3,0	2,5
Etelä-Pohjanmaa / Syd-Österbotten	-	-	-	1,8	1,8	1,9	4,9	4,8	5,6	5,1	5,3	5,4	6,8	5,7	5,6						