

Raskaudenkeskeytykset vuonna 2006 -ennakkotiedot

Aborter 2006 - preliminära uppgifter

Induced abortions 2006 - preliminary data

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279

sähköposti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården
National Research and
Development Centre for
Welfare and Health
Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71
Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459


www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 tehtiin 10 493 raskaudenkeskeytystä eli 8,9 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Tämä on 440 keskeytystä (-4,0 %) vähemmän kuin vuonna 2005.

Keskeytysten lukumäärä laski vuonna 2006 kaikissa ikäryhmissä edellisvuoteen nähden. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset vähenivät 5,1 prosenttia. Eniten keskeytyksiä tehdään edelleen 20-24 -vuotiaille, mutta tässäkin ikäryhmässä keskeytykset vähenivät 2,0 prosenttia. Sairaanhoidopiireittäin tarkasteltuna eniten keskeytyksiä tehtiin Länsi-Pohjan sairaanhoidopiirissä (12,2/1000) ja vähiten Keski-Pohjanmaan sairaanhoidopiirissä (5,7/1000).

Kuvio 1: Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti vuosina 2005 ja 2006*



* Vuoden 2006 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 15.3.2007.

Noin 62 prosenttia raskaudenkeskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäisymenetelmää raskauden alkaessa. Alle 20-vuotiaista 43 prosenttia ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä tai ehkäisymenetelmästä ei ollut tietoa. 48 prosenttia alle 20-vuotiaista keskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä ehkäisynä kondomia ja jälkiehkäisyä oli käyttänyt vain 1,9 prosenttia. Jälkiehkäisyä oli käyttänyt 2,8 prosenttia kaikista keskeytyspotilaista eli hieman enemmän kuin vuonna 2005.

Yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen oli e-pilleri (53 %). Alle 20-vuotiaille e-pilleriä suunniteltiin ehkäisykeinoksi 78,6 prosentissa tapauksista. Suunniteltua ehkäisyä ei ollut tai siitä ei ollut tietoa noin 8 prosentilla keskeytyspotilaista. Alle 20-vuotiaista 4,4 prosenttia ei ollut suunniteltua ehkäisyä tai siitä ei ollut tietoa.

Noin 93 prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehtiin ennen 12. raskausviikkoa. Ennen 7. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain olleen 60,2 prosenttia vuonna 2006. Vuonna 2006 vajaalla puolella keskeytyspotilaista oli vähintään yksi aikaisempi synnytys. Vähintään yksi aiempi keskeytys oli 33 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä noin 11 prosentilla. Keskeytyspotilaista noin 20 prosenttia oli naimisissa ja naimattomia oli 72 prosenttia. Eronneita ja leskiä oli 8 prosenttia.

Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (88,6 %) vuonna 2006. Muita yleisiä syitä olivat alle 17 vuoden ikä (6,1 %), yli 40 vuoden ikä (3,7 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). 0,4 % keskeytyksistä tehtiin lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinvasta tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi tehtiin hieman enemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2005 (2,7 % kaikista keskeytyksistä). Keskeytyksen perusteena on vuodesta 2001 alkaen voinut käyttää enemmän kuin yhtä syytä.

Käsitteet ja määritelmät

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjatkamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

Taustatietoja:

Vuoden 2006 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 15.3.2007. Lopulliset, tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2007.

SVT-sarjan (Suomen virallinen tilasto) laatuseloste

<http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Laatuselosteet/raskaudenkeskeytysjasterilisaatio.htm>

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006*

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2006*

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2006*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2006*

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2006*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2006*

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2006*

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2006*, %

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2006*, %

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1999-2006*

*) Ennakkotieto

Aborter 2006 - preliminära uppgifter

År 2006 gjordes enligt preliminära uppgifter 10 493 aborter, dvs. 8,9 aborter per 1 000 fertila kvinnor. Detta är cirka 440 aborter (-4,0 %) färre än 2005.

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359


Mika Gissler
+358 9 3967 2279

E-post:
fornamn.efternamn@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

Antalet aborter minskade i alla åldersgrupperna jämfört med föregående år. Aborterna bland kvinnor under 20 år minskade med 5,1 procent. Mest aborter görs fortfarande i åldrarna 20–24 år, men även i denna åldersgrupp minskade antalet med 2,0 procent. En granskning enligt sjukvårdsdistrikt visar att mest aborter utfördes i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (12,2/1 000) och minst i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (5,7/1 000).

Diagram 1: Antal aborter efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar 2005–2006*



Sosiaali- ja terveystalantutkimus- ja kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

* Uppgifterna för 2006 är preliminära och grundar sig på situationen den 15 mars 2007. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2007.

Cirka 62 procent av abortpatienterna uppgav att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod. I åldrarna under 20 år var 43 procent av fallen sådana där inget preventivmedel använts eller där det inte fanns några uppgifter om preventivmetoden. Av abortpatienterna under 20 år uppgav 48 procent att de använt kondom som preventivmedel och endast 1,9 procent hade använt akut p-piller. Av alla abortpatienter hade 2,8 procent använt akut p-piller, dvs. lite fler än 2005.

Den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp var p-piller (53 %). För kvinnor under 20 år planerades p-piller som preventivmetod i 78,6 procent av fallen. Ungefär 8 procent av abortpatienterna hade registrerats som fall där inget preventivmedel använts eller där det inte fanns några uppgifter om använd preventivmetod. I åldrarna under 20 år var motsvarande procenttal 4,4 procent.

Ungefär 93 procent av aborterna gjordes före den 12:e graviditetsveckan. Andelen aborter som utförts före den 7:e graviditetsveckan har ökat varje år. År 2006 var den 60,2 procent. År 2006 hade knappt hälften av abortpatienterna fött minst ett barn. 33 procent av dem som genomgick abort hade genomgått minst en tidigare abort. Cirka 11 procent hade genomgått minst två tidigare aborter. Av abortpatienterna var 20 procent gifta och 72 procent ogifta. Andelen frångående och änkor var 8 procent.

Antalet aborter på sociala indikationer ökade fortfarande (88,6 %) år 2006. Andra vanliga indikationer var ålder under 17 år (6,1 %) eller över 40 år (3,7 %) och fyra tidigare förlossningar (2,1 %). Av aborterna utfördes 0,4 procent på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslöshet eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. År 2006 utfördes lite mer aborter på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada än 2005 (2,7 % av alla aborter). Från och med 2001 har flera än en abortindikation kunnat åberopas.

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som avbrutits medvetet och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte dött intrauterint före själva ingreppet.

Med **sterilisering** avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.

Bakgrundsinformation:

Uppgifterna för 2006 är preliminära och grundar sig på situationen den 15 mars 2007. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2007.

FOS-kvalitetsbeskrivning (Finlands officiella statistik) för statistiken över aborter och steriliseringar http://www.stakes.fi/SV/tilastot/kvalitet/aborter_steriliseringar.htm

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2006*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2006*

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2006*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2006*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2006*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2006*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2006*

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2006*, %

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2006*, %

Tabell 10: Abortmetoder 1999–2006*

*) Preliminära uppgifter

Induced abortions 2006 - preliminary data

According to preliminary data, 10 493 induced abortions were performed in Finland in 2006, representing 8.9 abortions per thousand women of fertile age. This is 440 abortions (-4.0 per cent) less than in 2005.

Tiina Sevón
+358 9 3967 2306

Anne Soimula
+358 9 3967 2359


Mika Gissler
+358 9 3967 2279

Email:
forename.familyname@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2459

The number of induced abortions declined in all age groups compared with 2005. In the under-20 age group, abortions decreased 5.1 per cent. While the number of abortions was still highest in the 20–24 age group, even this group showed a decrease of 2.0 per cent. The number of abortions by hospital district was highest in the hospital district of Länsi-Pohja (12.2 per 1000) and lowest in the hospital district of Central Ostrobothnia (5.7 per 1000).

Figure 1: Induced abortions per 1000 of same age 2005–2006*



* The data for 2006 are preliminary and based on the situation on 15 March 2007.

Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for
Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

Some 62 per cent of the abortion patients reported having used some contraceptive method when the pregnancy started. In the under-20 age group, 43 per cent of the abortion patients had used no contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the same age group, 48 per cent reported having used a condom and a mere 1.9 per cent post-coital oral contraceptive. Of all abortion patients, 2.8 per cent had used post-coital oral contraceptive, which is slightly more than in 2005.

The most common planned contraceptive method after abortion was the pill (53 per cent). The pill was the planned contraceptive method for abortion patients under 20 in 78.6 per cent of the cases. Approximately 8 per cent of the abortion patients had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the under-20 age group, 4.4 per cent had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method.

Some 93 per cent of the abortions were performed before the 12th week of gestation. The proportion of induced abortions performed before the 7th week of gestation has increased annually, being 60.2 per cent in 2006. In 2006, less than half of the abortion patients had at least one previous delivery. At least one earlier induced abortion had been performed on 33 per cent of the abortion patients and at least two earlier abortions on about 11 per cent of the patients. The proportion of married abortion patients was 20 per cent, compared with 72 per cent for unmarried patients. The proportion of divorced women and widows was 8 per cent.

The proportion of abortions performed on social grounds was still increasing (88.6 per cent) in 2006. The other common reasons for abortion were the patient being under 17 (6.1 per cent) or over 40 (3.7 per cent), or having given birth to four children (2.1 per cent). 0.4 per cent of induced abortions were performed on medical grounds, meaning that the pregnancy would have endangered the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility. The number of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was slightly higher than in 2005 (2.7 per cent of all induced abortions). Since 2001, more than one ground for the abortion has been possible.

Terms and definitions

Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death before the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Additional information:

The data for 2006 are preliminary and based on the situation on 15 March 2007. The final data will be published in autumn 2007.

Quality reports of the OSF publication series (Official Statistics of Finland):
<http://www.stakes.fi/EN/tilastot/qualityreports/inducedabortions.htm>

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2006*

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2006*

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2006*

Table 4: Induced abortions by indication, 2006*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985-2006*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987-2006*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987-2006*

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989-2006*, %

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after the abortion 1983-2006*, %

Table 10: Methods for induced abortion, 1999-2006*

*) Preliminary data

Raskaudenkeskeytykset vuonna 2006 -ennakkotiedot

Aborter 2006 - preliminära uppgifter

Induced abortions 2006 - preliminary data

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006*

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2006*

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2006*, %

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2006 *

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2006*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2006*

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2006*

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989-2006*, %

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2006*, %

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000-2006*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2006*

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2006*, %

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2006*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2006*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2006*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2006*

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989-2006*, %

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983-2006*, %

Tabell 10: Abortmetoder 2000-2006*

Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975-2006*

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2006*

Table 3: Indications for induced abortion, 1970-2006*, %

Table 4: Induced abortions by indication, 2006*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985-2006*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987-2006*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987-2006*

Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989-2006*, %

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983-2006*, %

Table 10: Methods for induced abortion, 2000-2006*

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2006*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2006*

Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975-2006*

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntynyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	228,6	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,6	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	199,7	21,2	16,4	10,3	9,3	8,3	5,4	0,8	10,7
1984	13 645	209,7	20,9	17,1	10,9	9,7	8,8	5,4	0,8	10,9
1985	13 787	219,6	20,7	17,6	11,3	9,8	9,1	5,1	0,8	11,0
1986	13 316	219,6	19,5	18,3	11,0	10,0	8,6	4,8	0,6	10,6
1987	12 986	217,4	17,5	18,4	11,8	9,3	8,1	5,7	0,9	10,3
1988	12 738	201,6	16,7	19,4	12,1	9,1	7,9	5,1	0,8	10,1
1989	12 646	199,7	16,7	18,7	12,9	9,4	7,8	5,0	0,8	10,1
1990	12 217	186,6	15,6	18,3	12,5	9,8	7,4	4,7	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,5	17,5	13,1	9,7	7,6	4,4	0,8	9,3
1992	11 069	166,0	12,4	16,5	12,8	9,8	7,2	3,9	0,7	8,7
1993	10 375	160,2	10,9	15,5	12,8	9,7	6,9	3,4	0,5	8,2
1994	10 013	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,4	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 836	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 738	192,5	15,4	15,0	13,2	10,8	7,6	3,3	0,2	8,9
2002	10 974	198,3	16,3	16,6	12,6	10,7	7,7	3,3	0,2	9,1
2003	10 767	190,7	15,3	17,0	12,3	10,7	8,0	2,9	0,3	9,0
2004	11 161	193,9	15,7	18,5	12,7	10,7	8,0	3,2	0,2	9,4
2005	10 933	189,7	14,9	18,2	12,7	10,3	7,9	3,4	0,2	9,3
2006*	10 493	178,3	14,0	17,9	12,0	9,8	7,7	3,2	0,2	8,9

1) Vuosina 1969–1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

Åren 1969–1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969–1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2006*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2006*

Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2006*

Sairaanhoitopiiri ¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
	15-19 ²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	16,3	20,6	13,0	11,1	9,0	4,0	0,3	10,2
Helsinki - Helsingfors	18,3	19,7	12,4	12,3	10,4	4,4	0,4	11,1
Uusimaa - Nyland	15,3	21,5	13,7	10,3	8,1	3,8	0,3	9,6
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	13,3	17,1	11,3	9,0	6,5	3,4	0,4	8,6
Satakunta - Satakunta	13,4	18,7	10,6	9,2	6,9	2,9	0,1	8,3
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	14,4	15,8	11,4	7,8	6,9	1,7	0,0	7,7
Pirkanmaa - Birkaland	15,3	15,4	10,4	9,0	8,1	3,6	0,3	8,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	11,4	20,2	12,0	8,8	8,1	2,4	0,1	8,4
Kymenlaakso - Kymmenedalen	14,5	17,3	16,4	12,4	8,7	3,5	0,3	9,6
Etelä-Karjala - Södra Karelen	10,8	17,3	11,7	7,9	6,8	1,6	0,0	7,5
Etelä-Savo - Södra Savolax	11,6	16,0	9,8	4,9	5,4	2,3	0,0	6,6
Itä-Savo - Östra Savolax	13,2	18,1	8,4	8,1	5,5	3,5	0,9	7,6
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	12,3	15,5	12,7	11,5	6,6	3,2	0,2	8,3
Pohjois-Savo - Norra Savolax	12,3	17,9	10,4	9,3	7,2	2,2	0,0	8,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland	12,6	12,3	10,1	8,3	5,4	1,8	0,0	7,1
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	9,6	16,9	8,9	7,4	7,0	2,1	0,0	7,1
Vaasa - Vaasa	12,4	16,6	11,0	10,3	9,1	4,6	0,2	9,1
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	9,0	10,0	6,8	9,3	3,8	2,0	0,0	5,7
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	13,4	16,0	12,0	7,6	6,5	3,1	0,2	8,4
Kainuu - Kajanaland	12,8	18,3	15,4	11,5	3,3	1,1	0,0	7,9
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	16,3	26,4	21,7	10,3	12,6	3,7	0,0	12,2
Lappi - Lappland	17,6	18,4	15,4	15,7	9,9	3,7	0,0	10,6
Ahvenanmaa - Åland	13,7	22,9	15,1	8,7	6,2	3,1	1,0	9,1
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	14,0	17,9	12,0	9,8	7,7	3,2	0,2	8,9

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Efter hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2006*, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2006*, %

Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2006*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år under 17	Täyttänyt 40 v. Över 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	..	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	..	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 323
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 640
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 316
1987	1,7	83,4	..	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,3	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0,0	100	11 069
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	85,4	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 013
1995	0,5	86,1	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	86,8	0,0	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	86,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 836
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	0,0	100	10 932
2001	0,4	84,7	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	101	10 819 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,2	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,6	0,0	102	11 163
2003	0,5	86,6	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,4	0,0	102	10 970
2004	0,4	88,2	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,5	0,1	102	11 431
2005	0,5	86,9	0,1	6,2	4,0	2,2	0,9	1,7	0,0	103	11 212
2006*	0,4	88,6	0,0	6,1	3,7	2,1	1,0	1,7	0,0	104	10 867

1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. *Under the current law.*

2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistik endast över totalt antal. *Statistics on available total number only.*

3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

4) Useampi peruste mahdollinen v. 2001 alkaen. Mera än en indikation möjlig sedan år 2001. *More than one indication possible since 2001.*

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2006 *

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2006*

Table 4: Induced abortions by indication, 2006*

Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication						Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
	Lääketiet. Medicinsk Medical	Sosiaa- linen Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 vuotta Över 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children				
Naimisissa - Gift - Married	19	1 630	2	1	191	132	56	112	..	2 143
Naimaton - Ogift - Single	20	6 902	2	637	121	45	42	59	..	7 828
Leski - Änka - Widowed	..	14	5	..	1	20
Eronnut - Frånskild - Divorced	4	744	75	39	3	7	..	872
Tuntematon - Okänd - Unknown	..	3	3
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 293	4	638	392	216	102	178	..	10 866
Ikä - Ålder - Age ²⁾										
-13	3	3
14	..	5	..	62	67
15	..	22	..	183	205
16	..	85	..	322	2	..	409
17	..	427	..	68	1	2	..	498
18	..	564	1	..	565
19	1	622	2	625
20-24	5	2 868	2	2	13	17	..	2 907
25-29	11	1 873	25	19	38	..	1 966
30-34	8	1 368	1	62	26	50	..	1 515
35-39	11	1 185	1	88	18	37	..	1 340
40-44	7	262	363	36	21	30	..	719
45-49	..	11	29	3	2	1	..	46
Tuntematon - Okänd - Unknown	..	1
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 293	4	638	392	216	102	178	..	10 866
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries										
0	14	4 880	1	633	49	..	44	64	..	5 685
1	7	1 816	2	5	79	..	39	64	..	2 012
2	13	1 642	1	..	145	2	9	32	..	1 844
3	5	768	77	9	5	9	..	873
4	1	133	29	148	2	8	..	321
5	3	34	10	44	1	92
6	..	15	9	24
7	..	1	1	1	..	3
8	..	2	2	4
9-	..	2	3	2	1	8
Tuntematon - Okänd - Unknown
Yhteensä - Totalt - Total	43	9 293	4	638	392	216	102	178	..	10 866

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter

Preliminary information.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2006*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2006*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2006*

	Viikkoja - Veckor - Weeks							
	-7	8	9	10	11	12-	Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
N								
1985	4 438	3 073	2 637	1 982	943	712	2	13 787
1986	4 542	2 980	2 459	1 783	869	682	1	13 316
1987	4 130	2 951	2 486	1 765	962	679	13	12 986
1988	4 170	2 722	2 367	1 828	982	667	2	12 738
1989	4 138	2 693	2 448	1 798	858	707	4	12 646
1990	4 074	2 693	2 285	1 680	812	671	2	12 217
1991	4 266	2 565	2 126	1 466	669	645	..	11 737
1992	4 131	2 374	1 987	1 340	628	609	..	11 069
1993	3 996	2 306	1 809	1 158	550	556	..	10 375
1994	4 096	2 140	1 615	1 096	461	605	..	10 013
1995	4 018	2 089	1 661	1 079	436	589	..	9 872
1996	4 199	2 273	1 641	1 102	600	604	4	10 423
1997	4 307	2 253	1 556	1 087	465	581	1	10 250
1998	4 702	2 293	1 596	1 075	459	623	3	10 751
1999	4 770	2 318	1 549	1 098	456	644	1	10 836
2000	4 977	2 233	1 583	1 036	431	672	..	10 932
2001	5 843	1 727	1 212	915	358	683	..	10 738
2002	6 180	1 697	1 096	877	383	741	..	10 974
2003	6 269	1 623	959	783	377	716	..	10 767
2004	6 528	1 713	992	739	409	780	..	11 161
2005	6 544	1 674	917	686	342	768	2	10 933
2006*	6 322	1 580	877	638	340	735	1	10 493
%								
1985	32,2	22,3	19,1	14,4	6,8	5,2	0,0	100
1986	34,1	22,4	18,5	13,4	6,5	5,1	0,0	100
1987	31,8	22,7	19,1	13,6	7,4	5,3	0,1	100
1988	32,7	21,4	18,6	14,4	7,7	5,3	0,0	100
1989	32,8	21,3	19,4	14,2	6,8	5,4	0,0	100
1990	33,3	22,0	18,7	13,8	6,6	5,6	0,0	100
1991	36,3	21,9	18,1	12,5	5,7	5,4	..	100
1992	37,3	21,4	18,0	12,1	5,7	5,4	..	100
1993	38,5	22,2	17,4	11,2	5,3	5,3	..	100
1994	40,9	21,4	16,1	10,9	4,6	5,9	..	100
1995	40,7	21,2	16,8	10,9	4,4	6,0	..	100
1996	40,3	21,8	15,7	10,6	5,8	5,7	0,0	100
1997	42,0	22,0	15,2	10,6	4,5	5,8	0,0	100
1998	43,8	21,3	14,8	10,0	4,3	5,9	0,0	100
1999	44,0	21,4	14,3	10,1	4,2	5,8	0,0	100
2000	45,5	20,4	14,5	9,5	3,9	6,1	..	100
2001	54,4	16,1	11,3	8,5	3,3	6,4	..	100
2002	56,3	15,5	10,0	8,0	3,5	6,6	..	100
2003	58,6	15,1	8,9	7,3	3,5	6,7	..	100
2004	58,5	15,3	8,9	6,6	3,7	6,9	..	100
2005	59,8	15,3	8,4	6,3	3,1	7,0	0,0	100
2006*	60,2	15,1	8,4	6,1	3,2	7,1	0,0	100

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2006*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2006*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2006*

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
Previous deliveries								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon	Yhteensä
							Okänt	Totalt
							<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
N								
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 596	1 957	2 171	945	239	94	11	10 013
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	..	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	..	10 751
1999	5 431	1 951	2 133	984	245	92	..	10 836
2000	5 672	1 903	2 064	938	270	85	..	10 932
2001	5 495	1 962	2 011	913	249	107	1	10 738
2002	5 742	1 957	2 026	885	270	94	..	10 974
2003	5 684	1 920	1 924	880	256	103	..	10 767
2004	5 912	2 058	2 027	820	247	97	..	11 161
2005	5 805	2 008	1 875	856	271	118	..	10 933
2006*	5 509	1 982	1 798	851	258	95	..	10 493
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	..	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	..	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	..	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	..	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	..	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	..	100
2004	53,0	18,4	18,2	7,3	2,2	0,9	..	100
2005	53,1	18,4	17,1	7,8	2,5	1,1	..	100
2006*	52,5	18,9	17,1	8,1	2,5	0,9	..	100

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2006*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2006*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2006*

Aikaisemmat keskeytykset								
Tidigare aborter								
Previous abortions								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon	Yhteensä
							Okänt	Totalt
							<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
N								
1987	9 454	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 930	2 133	602	141	44	29	134	10 013
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	..	10 751
1999	7 776	2 183	624	171	52	29	1	10 836
2000	7 770	2 257	649	172	55	29	..	10 932
2001	7 595	2 250	621	189	48	33	2	10 738
2002	7 703	2 277	687	218	49	38	2	10 974
2003	7 355	2 385	700	198	84	45	..	10 767
2004	7 612	2 414	788	230	67	49	1	11 161
2005	7 437	2 363	762	237	72	60	2	10 933
2006*	7 015	2 360	735	247	81	54	1	10 493
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	..	100
1999	71,8	20,1	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	..	100
2001	70,7	21,0	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,2	6,5	1,8	0,8	0,4	..	100
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,4	0,0	100
2005	68,0	21,6	7,0	2,2	0,7	0,5	0,0	100
2006*	66,9	22,5	7,0	2,4	0,8	0,5	0,0	100

***) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 8: Raskaudeneskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2006*, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2006*, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2006*, %

	E-tabletti¹⁾	Kohdunsisäinen	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Jälkiehkäisy²⁾	Yhteensä³⁾
	P-pilleri	hormoniehkäisin	Spiral	Kondom	Sterilisering	Annat	Ingenting	Okänt	Akut p-pilleri	Totalt
	<i>Pill</i>	<i>Hormonspiral</i>	<i>IUD</i>	<i>Condom</i>	<i>Sterilisation</i>	<i>Other</i>	<i>Nothing</i>	<i>Unknown</i>	<i>Post-coital oral contraceptive</i>	<i>Total</i>
		<i>Hormone releasing IUD</i>								
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,7	35,7	4,8	1,5	104,4
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,5	5,9	2,3	105,2
2004	9,8	0,2	1,0	46,6	0,3	3,4	36,4	4,6	2,1	104,4
2005	9,3	0,3	0,9	46,5	0,4	3,6	37,0	4,5	2,7	105,2
2006*	9,3	0,2	0,8	45,5	0,3	3,1	38,2	4,9	2,8	105,1

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-pilleri eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämns. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Flera än en metod möjliga. More than one method possible.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 9: Raskaudeneskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2006*, %

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2006*, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2006*, %

	E-tabletti¹⁾	Kohdunsisäinen	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Yhteensä
	P-pilleri	hormoniehkäisin	Spiral	Kondom	Sterilisering	Annat	Ingenting	Okänt	Totalt
	<i>Pill</i>	<i>Hormonspiral</i>	<i>IUD</i>	<i>Condom</i>	<i>Sterilisation</i>	<i>Other</i>	<i>Nothing</i>	<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
		<i>Hormone releasing IUD</i>							
1983	33,1	0,0	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	0,0	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,5	0,0	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100,0
1986	51,1	0,0	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100,0
1987	53,0	0,0	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100,0
1988	56,1	0,0	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100,0
1989	57,7	0,0	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100,0
1990	57,5	0,0	20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100,0
1991	54,8	0,0	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100,0
1992	54,9	0,0	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,0
1993	57,0	0,0	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100,0
1994	57,4	0,0	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100,0
1995	56,6	0,0	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,0
1996	53,7	0,0	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,0
1997	57,6	0,0	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,0
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100,0
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100,0
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,9	100,0
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100,0
2004	53,5	10,0	11,5	3,6	3,8	11,8	1,3	7,2	100,0
2005	53,7	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,1	100,0
2006*	52,8	13,5	10,0	3,0	3,0	12,8	1,2	7,0	100,0

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-pilleri eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2006*

Tabell 10: Abortmetoder 2000–2006*

Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2006*

	Laajennus, imukaavinta Dilatation, vakuum- aspiration Dilation, suction currettage	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta Dilatation, exeres, vakuum- aspiration Dilation, evacuation, suction currettage	Varhaisu Tidig aspiration Early suction	Abortiivaine Abortimetel Abortion- inducing drug	Prostaglandiini tai muu lääke Prostaglandin eller annat läkemetel Prostaglandin or other drug	Mifegyne Mifegyne Mifegyne	Keisari- leikkaus Kejsarsnitt Caesarean section	Muu Annan Other	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
Yhteensä - Totalt - Total										
N										
2000	9 230	339	191	485	246	430	3	8	..	10 932
2001	7 204	232	159	532	400	2 195	5	11	..	10 738
2002	6 013	139	142	607	413	3 653	3	4	..	10 974
2003	5 006	112	104	658	541	4 339	2	5	..	10 767
2004	4 574	125	83	720	703	4 945	2	8	1	11 161
2005	3 734	95	94	719	472	5 808	..	9	2	10 933
2006*	3 108	82	64	712	483	6 032	1	10	1	10 493
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	2,3	3,9	0,0	0,1	..	100
2001	67,1	2,2	1,5	5,0	3,7	20,4	0,0	0,1	..	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	3,8	33,3	0,0	0,0	..	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	5,0	40,3	0,0	0,0	..	100
2004	41,0	1,1	0,7	6,5	6,3	44,3	0,0	0,1	0,0	100
2005	34,2	0,9	0,9	6,6	4,3	53,1	..	0,1	0,0	100
2006*	29,6	0,8	0,6	6,8	4,6	57,5	0,0	0,1	0,0	100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week										
N										
2000	9 141	284	191	14	207	419	..	4	..	10 260
2001	7 120	197	159	22	372	2 180	..	5	..	10 055
2002	5 952	109	142	15	370	3 645	10 233
2003	4 962	87	104	17	540	4 339	..	2	..	10 051
2004	4 527	99	83	19	703	4 945	1	3	1	10 381
2005	3 688	82	94	16	472	5 807	..	4	..	10 163
2006*	3 084	71	64	20	482	6 032	..	4	..	9 757
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,0	4,1	..	0,0	..	100
2001	70,8	2,0	1,6	0,2	3,7	21,7	..	0,0	..	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	3,6	35,6	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	5,4	43,2	..	0,0	..	100
2004	43,6	1,0	0,8	0,2	6,8	47,6	0,0	0,0	0,0	100
2005	36,3	0,8	0,9	0,2	4,6	57,1	..	0,0	..	100
2006*	31,6	0,7	0,7	0,2	4,9	61,8	..	0,0	..	100
13. viikolla tai sen jälkeen / vecka 13 eller därefter / 13th week of thereafter										
N										
2000	89	55	..	471	39	11	3	4	..	672
2001	84	35	..	510	28	15	5	6	..	683
2002	61	30	..	592	43	8	3	4	..	741
2003	44	25	..	641	1	..	2	3	..	716
2004	47	26	..	701	1	5	..	780
2005	46	13	..	704	5	..	768
2006*	24	11	..	692	1	..	1	6	..	735
%										
2000	13,2	8,2	..	70,1	5,8	1,6	0,4	0,6	..	100
2001	12,3	5,1	..	74,7	4,1	2,2	0,7	0,9	..	100
2002	8,2	4,0	..	79,9	5,8	1,1	0,4	0,5	..	100
2003	6,1	3,5	..	89,5	0,1	..	0,3	0,4	..	100
2004	6,0	3,3	..	89,9	0,1	0,6	..	100
2005	6,0	1,7	..	91,6	0,7	..	100
2006*	3,3	1,5	..	94,1	0,1	..	0,1	0,8	..	100

*Ennakotieto.

*Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilaston laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilasto sisältää tietoja raskaudenkeskeytysten ja sterilointien lukumäärästä vuosittain. Keskeytykset esitetään myös ikäryhmittäin ja sairaanhoitopiireittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti. Steriloinnit esitetään sukupuolittain ja ikäryhmittäin tuhatta 25-54 -vuotiasta naista tai miestä kohti.

Lisäksi tilastotiedotteessa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten ja sterilointien perusteista, raskaudenkeskeytyksen suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, raskaudenkeskeytyspotilaiden aikaisemmista keskeytyksistä ja synnytyksistä, käytetyistä raskaudenkeskeytysmenetelmistä sekä raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämistä ja heille suunnitelluista ehkäisymenetelmistä.

Tiedote on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada nopeasti mahdollisimman ajantasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja steriloinneista.

Tilastotiedotteiden tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet, määritelmät ja symbolit.

Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskukseen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) sekä asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitiedot on kerätty kaikista Suomen raskaudenkeskeytyksiä ja sterilointeja suorittavista sairaaloista. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, joille on tehty raskaudenkeskeytys tai sterilisaatio. Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 238/1970 ja Steriloimislaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti toimenpiteen suorittajalääkäriin on toimitettava Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoituksen Stakesille suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan lomakkeilta sähköisessä muodossa raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (566/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella. Aineiston tarkistusajoja tehdään säännöllisesti ja epäselvät tapaukset tarkistetaan toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta. Tilaston kattavuus on lähes aina 100 %.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Epäselvien tapausten selvittämiseksi raskaudenkeskeytys- ja sterilointirekisterin tietoja verrataan muiden rekisterien (syntymärekisteri ja hoitoilmoitusrekisteri) tietoihin. Tarvittaessa pyydetään tarkistus toimenpiteen suorittaneesta sairaalasta.

Ennakkotilaston perusteella tehdyn arvion on todettu olevan hyvin lähellä todellista lukumäärää. Yleensä ennakkotilastossa ilmoitetut lukumäärät lisääntyvät hieman lopulliseen tilastoon, koska muutamia lomakkeita palautuu viiveellä sairaaloista. Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitilasto on Stakesin kaksi kertaa vuodessa tuottama tilasto. Tilasto ilmestyy huhti- ja syyskuussa. Huhtikuun tilasto on edellisen vuoden ennakkotilasto ja syyskuun tilasto on edellisen vuoden lopullinen tilasto. Lisäksi vuosittain syksyllä ilmestyy puolivuotisennakkotilasto koskien kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden raskaudenkeskeytyksiä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedotteet lähetetään toimenpiteitä suorittaviin sairaaloihin ja julkaistaan Stakesin internet-sivulla osoitteessa <http://www.stakes.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset>

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan 1.7.1950. Tilastoja raskaudenkeskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Raskaudenkeskeytys- ja sterilointitiedot ovat vuodesta 1987 alkaen Stakesin tietokannassa. Varhaisempien vuosien tiedot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintöhallitus vuosina 1935-1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoitotilasto vuosina 1955-1970; Terveystieteiden tutkimuskeskus vuosina 1971-1987).

Vuosien 1987-2001 aineistoa on tarkastettu mm. poistamalla kaksoiskappaleita ja lisäämällä aikaisemmin tilastosta puuttuneita tapauksia. Siksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista. Ikäryhmiä tarkasteltaessa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, sitä ennen ikä vuoden lopussa. Tilastotiedotteisiin on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä. Tarkemmat tiedot tilastojen tulkintaan vaikuttavista tekijöistä, mm. lakimuutoksista, on mainittu kunkin taulukon kohdalla erikseen.

Raskaudenkeskeytyksen ja steriloinnin käsitteet ja määritelmät ovat pysyneet koko ajan samoina.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedote sisältää koko maan kattavasti tiedot suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä ja steriloinneista. Ennakkotilaston lukumäärät on verrattavissa lopullisen vuositilaston lukumääriin.

Kvalitetsbeskrivning för statistiken över aborter och steriliseringar

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över aborter och steriliseringar innehåller uppgifter om det årliga antalet aborter och steriliseringar. Aborterna presenteras också efter åldersgrupp och sjukvårdsdistrikt per 1000 kvinnor i samma åldrar. Steriliseringarna presenteras efter kön och åldersgrupp per 1000 kvinnor eller män i åldrarna 25–54 år.

Dessutom presenteras i statistikmeddelandet uppgifter om abort- och steriliseringsindikationerna, aborttidpunkten enligt graviditetsvecka, tidigare aborter och förlossningar som abortpatienterna genomgått, använda abortmetoder samt preventivmetoder som abortpatienterna använt eller som de enligt planerna kommer att börja använda.

Meddelandet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom specialiteten fortplantningshälsa, förvaltningsmyndigheter, planerare och forskare, som snabbt behöver så aktuella uppgifter om aborter och steriliseringar som möjligt.

I statistikmeddelandet förklaras de använda begreppen, definitionerna och symbolerna.

Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) samt på lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av lagen.

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen

Uppgifterna om aborter och steriliseringar har samlats in från alla finländska sjukhus där aborter och steriliseringar utförs. Statistikpopulationen utgörs av personer som genomgått abort eller sterilisering. Enligt lagarna om ingrepp (Lag om avbrytande av havandeskap 238/1970, Steriliseringslag 283/1970) och de förordningar som utfärdats med stöd av dem (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna tas från blanketterna och lagras elektroniskt i Abort- och steriliseringsregistret, som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (566/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag. Materialet kontrolleras regelbundet och oklara fall kontrolleras med det sjukhus där ingreppet utförts. Statistikens täckning är nästan alltid 100 procent.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. Uppgifterna i Abort- och steriliseringsregistret jämförs med uppgifterna i andra register (födelseregistret och vårdanmälningsregistret) för att få klarhet i oklara fall. Vid behov begärs en bekräftelse från det sjukhus där ingreppet utförts.

Den uppskattning som gjorts på grundval av den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det faktiska antalet. I allmänhet ökar de antal som angetts i den preliminära statistiken

lite i den slutliga statistiken, eftersom några formulär returneras av sjukhusen med visst dröjsmål. Eventuella fel som hittas i statistiken korrigeras.

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna

Stakes sammanställer två gånger per år preliminär statistik över aborter och steriliseringar. Statistiken utkommer i april och september. Aprilstatistiken är preliminär statistik över föregående år och septemberstatistiken är den slutliga statistiken över föregående år. Dessutom utkommer varje höst preliminär halvårsstatistik över aborter under det innevarande årets sex första månader.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet

Statistikmeddelandena sänds till de sjukhus som utför ingreppen och offentliggörs på Stakes webbsidor på adressen <http://www.stakes.fi/statistik/aborter>.

Statistikens jämförbarhet

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970. I Stakes databas finns abort- och steriliseringsuppgifter från och med år 1987. Uppgifterna från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintöhallitus [Medicinalstyrelsen] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoitotilasto [Allmän hälso- och sjukvårdsstatistik] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987.

Materialet från 1987–2001 har kontrollerats bl.a. genom att ta bort dubletter och lägga till fall som saknats i statistiken. Därför kan en del av uppgifterna avvika från statistik som offentliggjorts tidigare. När man granskar åldersgrupper, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I statistikmeddelandena har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen. Närmare uppgifter om sådana faktorer som påverkar tolkningen av statistiken, t.ex. lagändringar, anges separat vid varje tabell.

I övrigt har de abort- och steriliseringsrelaterade begreppen och definitionerna varit de samma hela tiden.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Statistikmeddelandet innehåller uppgifter på nationell nivå om utförda aborter och steriliseringar. Antalen i den preliminära statistiken är jämförbara med antalen i den slutliga årsstatistiken.

Quality report of the OSF publication series

The register of induced abortions and sterilisations

Relevance of statistical data

The Register of Induced Abortions and Sterilisations contains data on the annual numbers of induced abortions and sterilisations. In addition, data on induced abortions are provided by age group and hospital district per 1000 women of the same age, and data on sterilisations by gender and age group per 1000 women or men aged 25–54.

The Statistical Summary also gives numbers concerning grounds for induced abortions and sterilisations, the gestational stage at which induced abortions are performed, previous abortions and deliveries among abortion patients, methods of abortion used, and the contraceptive methods that abortion patients have used or that have been planned for them.

The Statistical Summary aims to provide up-to-date information on induced abortions and sterilisations to health-care professionals, administrators, planning officials and researchers working in the area of reproductive health and thus in need of this type of information.

The Summary text describes the concepts, definitions and symbols used in the statistics.

The collection of data is based on the Act on the Statistical Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health (409/2001), as well as on the Act (556/1989) and the Decree (774/1989) on National Personal Records Kept under the Health Care System.

Description of methods used in statistical research

Data on induced abortions and sterilisations are collected from all hospitals in Finland that perform induced abortions and sterilisations. The statistical population consists of all persons who have undergone induced abortion or sterilisation. In accordance with the current legislation (Act (238/1970) and Decree (359/1970) on Induced Abortion; Act (283/1970) and Decree (427/1985) on Sterilisation), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data in the forms are stored electronically in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES pursuant to the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (566/1989), and Section 6 of the subsequent Decree (774/1989). Data check-ups are made regularly and any unclear cases and diagnoses are checked and ascertained by contacting the hospitals that have performed the procedure concerned. The statistics almost invariably have a coverage of 100%.

Correctness and accuracy of data

The data are correct if they have been reported correctly. In unclear cases, the data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations are compared with those in other registers (Birth Register, Care Register). If necessary, the hospital that has performed the procedure is contacted for ascertaining the data.

Estimates made on the basis of the preliminary statistics have found to be very close to the real figures. The numbers of cases given in the preliminary statistics are usually somewhat lower than those in the final statistics as a few notification forms from the hospitals may arrive with a delay. Any errors identified in the statistics will be corrected.

Timeliness and promptness of published data

Statistics on induced abortions and sterilisations are produced by STAKES biannually, and published in April and September. The April statistics consist of the previous year's preliminary statistics, while the September statistics consist of the previous year's final statistics. In addition, half-year preliminary statistics are published each autumn concerning induced abortions performed during the ongoing year's first six months.

Accessibility and transparency/clarity of data

In addition to being published at the STAKES website at <http://www.stakes.fi/statistics/abortions>.

The Statistical Summary is sent to all hospitals that perform abortions and sterilisations.

Comparability of statistical data

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, whilst statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortions originates from 1970. Since 1987, data on induced abortions and sterilisations have been kept in a STAKES database. Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years.

Data for 1987–2001 have been checked for instance by removing data that had been entered twice and by adding missing cases, so that these data may deviate from previously published statistics to a degree. With regard to age specific data, it should be noted that from 1994 onwards such data in the Register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years refer to the age at the end of the year. For the purposes of the Statistical Summary, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure. More accurate information on any factors influencing the interpretation of the statistics, such as legislative reforms, is given specifically for each table.

The concept of induced abortion and that of sterilisation, as well as their definitions, have remained unchanged all the time.

Clarity and consistency

The data on induced abortions and sterilisations in the Statistical Summary are nationwide. The numbers of cases given in the preliminary statistics are comparable with those in the final annual statistics.