

Sosiaali- ja terveystilastot

PL 220, 00531 Helsinki

Puh. (09) 3967 2244 Vuori Eija

Puh. (09) 3967 2279 Gissler Mika


Fax. (09) 3967 2459

e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

**Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2000–
tiedonantajapalaute 16/2001**

Stakes ja sen edeltäjät ovat keränneet tietoja synnytyksistä vuodesta 1987 lähtien. Vuonna 2000 synnytyksiä oli 56 473. Synnytysten määrä kääntyi laskuun 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 2000 oli 10 prosenttia vähemmän synnytyksiä kuin vuonna 1995 ja edellisvuoteen nähden synnytysten määrä väheni vuonna 2000 1,6 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämien vuoden 2001 kahdeksan ensimmäisen kuukauden tietojen perusteella synnytysten määrä vähenisi edelleen 1,8 prosenttia kuluvana vuonna. Kokonaisuushedelmällisyyslukumme on pysynyt jo pitkään eurooppalaiseen tasoon nähden varsin korkeana (noin 1,7).

Kuvio: Synnyttäjien lukumäärä 1987-2000



Vuonna 2000 noin 18 prosenttia kaikista synnyttäjistä oli yli 35-vuotiaita, kun heitä vuonna 1995 oli noin 15 prosenttia. Samoin alle 20-vuotiaiden synnyttäjien määrä on noussut, ja heitä oli vuonna 2000 vajaat 3 prosenttia kaikista synnyttäjistä. Vuonna 2000 kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 29,9 vuotta, eikä se ole enää noussut vuoden 1998 jälkeen. Ensisynnyttäjien ikä on pysynyt samalla tasolla jo vuodesta 1995, ja se oli vuonna 2000 27,6 vuotta. Tupakointi raskauden aikana on 1990-luvun alun 16,5 prosentista vähentynyt 14,0 prosenttiin.

Monisikiöisten synnytysten määrä kasvoi vuoden 1987 1,1 prosentista 1,7 prosenttiin vuonna 1998, mikä osittain johtuu hedelmättömyyshoitojen yleistymisestä. Vuonna 2000 monisikiöisiä oli 1,6 prosenttia. Väheneminen johtuu mm. hedelmöityshoidoissa siirrettyjen alkuiden vähentämisestä.

Synnyttäjien hoitopäivät synnytyksen yhteydessä ovat lyhentyneet; vuonna 2000 äideistä 9,6 prosenttia oli sairaalassa vähintään kaksi päivää ennen synnytystä ja 3,6 prosenttia vähintään viikko synnytyksen jälkeen, ja vastaavat luvut olivat vuonna 1991 12 prosenttia.

Keisarileikkauksia tehtiin 1990-luvun alussa noin 14 prosentille synnyttäjistä ja vuonna 2000 noin 16 prosentille. Epiduraalipuudutus kivunlievityksenä on jatkuvasti yleistynyt; vuonna 2000 38,3 prosentille synnyttäjistä oli annettu kyseistä kivunlievitystä. Vähintään yhtä kivunlievitysmenetelmää oli käytetty vuonna 1991 64 prosentille synnyttäjistä, kun vuonna 2000 vastaava luku oli 74 prosenttia. Synnytystoimenpiteistä episiotomiat olivat sen sijaan vähentyneet vuoden 1991 56 prosentista 42 prosenttiin vuonna 2000.

Ennenaikaisena (ennen 37 täyttä raskausviikkoa) tai pienipainoisena (alle 2500 g) syntyneiden lasten osuus on kasvanut. 1990-luvun alussa ennenaikaisesti syntyi 5,6 prosenttia lapsista osuuden ollessa 6,3 prosenttia vuonna 2000. Pienipainoisten osuus on vastaavasti kasvanut 4,0 prosentista 4,5 prosenttiin.

Perinataalikuolleisuus vuonna 2000 oli edellisvuoden tasolla: kuolleena syntyi tai ensimmäisen elinviikon aikana kuoli 5,7 lasta tuhannesta lapsesta. Suomen kuolleisuusluku on maailman alhaisimpia yhdessä Norjan, Ruotsin, Islannin ja Japanin kanssa.

Taulukot:

Taulu 1: Syntymärekisterin trendejä 1987-2000

Taulu 2: Synnyttäjät, syntyneet lapset, perinataalikuolleet 2000 sairaanhoitopiireittäin

Lähteet:

Syntymärekisterissä on vuodesta 1987 lähtien tietoja kaikista Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista. Rekisteriin otetaan mukaan kaikki elävänä syntyneet lapset ja ne kuolleena syntyneet, joiden syntymäpaino on vähintään 500 g tai joiden gestatioikä on vähintään 22 viikkoa. Jokaisesta syntyneestä lapsesta on sairaalassa täytettävä seitsemän päivän ikään mennessä lomake, joka lähetetään joko paperi- tai atk-muodossa Stakesiin. Kotisyntymysten osalta lomakkeen täyttämistä huolehtii synnytyksessä avustanut kätilö tai lääkäri. Stakesiin lähetetyt tiedot tarkastetaan, ja puuttuvat sekä virheelliseksi epäillyt tiedot tarkastetaan sairaalasta. Syntymärekisteristä puuttuu noin 1-2 % vastasyntyneistä. Tämän vuoksi syntymärekisteriä täydennetään Väestörekisterikeskuksen elävänä syntyneiden lasten tiedoilla sekä Tilastokeskuksen kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen viikon aikana kuolleiden lasten tiedoilla.

Termit:

Elävänä syntynyt: Vastasyntynyt, joka raskauden kestosta riippumatta synnyttyään hengittää tai osoittaa muita elonmerkkejä, kuten sydämenlyönnejä, napanuoran sykintää tai tahdonalaisten lihasten liikkeitä riippumatta siitä, onko istukka irtaantunut tai napanuora katkaistu.

Imeväiskuolleisuus: Vuotta nuorempana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti.

Kuolleena syntynyt: Sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elävänä syntyneen elonmerkkejä ja jonka syntymätapahtuma täyttää synnytyksen määritelmän.


Perinataalikuolleisuus: Kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana (< 7 vrk) kuolleiden lasten määrä tuhatta syntynyttä kohti.

Synnytys (syntynyt lapsi): Vähintään 22 raskausviikon ($\geq 22+0$ rvk) ikäisen tai vähintään 500 gramman (≥ 500 g) painoisen sikiön tai lapsen syntymiseen johtava tapahtuma. 22-23 raskausviikolla ($\leq 24+0$ rvk) Terveysturvakeskuksen luvalla tehty raskauden keskeytys ei ole synnytys.

Föderskor, förlossningar och nyfödda 2000– uppgiftsgivarrespons 16/2001

Stakes och dess föregångare har samlat in uppgifter om förlossningar ända från 1987. År 2000 var antalet förlossningar 56 473. Antalet började minska i mitten av 1990-talet. År 2000 var antalet 10 procent mindre än 1995 och 1,6 procent mindre än året innan. Enligt de uppgifter Statistikcentralen samlat in från de åtta första månaderna år 2001 skulle antalet förlossningar under pågående år minska med drygt 1,8 procent. Vårt summerat fruktsamhetstal (ca 1,7) har dock redan länge varit på en tämligen hög nivå i förhållande till den europeiska nivån.

Figur: Antalet föderskor 1987-2000



Av föderskorna är allt flera över 35 år. År 2000 var andelen 18 procent jämfört med ca 15 procent år 1995. Antalet föderskor under 20 år har ökat och uppgick till ca 3 procent av alla föderskor år 2000. Medelåldern bland föderskorna var 29,9 år och har inte mera stigit efter 1998. Medelåldern bland förstföderskor har också stannat på samma nivå sedan 1995. År 2000 var den 27,6 år. Tobaksrökningen under graviditeten har minskat från 16,5 procent i början av 1990-talet till 14,0 procent.

Antalet flerbarnsbörder ökade från 1,1 procent år 1987 till 1,7 procent år 1998, vilket delvis beror på den ökade infertilitetsbehandlingen. År 2000 var andelen av flerbarnsbörder 1,6 procent. Minskningen beror bland annat på att antalet embryon som överförs vid befruktningsbehandlingen minskats.

Antalet vård dagar i samband med förlossningen har minskat: år 2000 var 9,6 procent av mödrar på sjukhuset minst två dagar före förlossningen och 3,6 procent minst en vecka efter förlossningen, medan motsvarande siffror år 1991 var 12 procent.

I början av 1990-talet utfördes kejsarsnitt i 14 procent av förlossningarna jämfört med 16 procent år 2000. Användningen av epiduralbedövning som smärtlindring har ständigt blivit vanligare; år 2000 användes denna smärtlindringsmetod i 38,3 procent av fallen. Andelen föderskor som använt minst en smärtlindringsmetod ökade från 64 procent år 1991 till 74 procent år 2000. Däremot minskade användningen av episiotomi från 56 procent år 1991 till 42 procent år 2000.

Andelen prematurer (födda efter mindre än 37 fulla graviditetsveckor) samt barn med låg födelsevikt (< 2500 g) har likaså ökat. I början av 1990-talet föddes 5,6 procent av barnen för tidigt, medan andelen år 2000 hade stigit till 6,3 procent. Andelen barn med låg födelsevikt har i sin tur ökat från 4,0 procent till 4,5 procent.

Den perinatale dödligheten var år 2000 på samma nivå som föregående år. Andelen dödfödda, eller sådana som dött under den första levnadsveckan, var 5,7 på 1 000 nyfödda. Dödlighetstalet i Finland hör till världens lägsta, tillsammans med Norge, Sverige, Island och Japan.

Tabeller:

Tabell 1: Trender i födelseregistret 1987-2000

Tabell 2: Föderskor, födda barn, perinataldöda enligt sjukvårdsdistrikt 2000

Källor:

Födelseregistret innehåller sedan år 1987 uppgifter om samtliga barnaföderskor i Finland samt om de födda barnen. Registret upptar alla levande födda barn, och de dödfödda barn vilkas födelsevikt är minst 500 g, eller vilkas gestationsålder är minst 22 veckor. Sjukhuset bör för varje nyfött barn inom sju dagar fylla i en blankett som sänds till Stakes i pappers- eller elektronisk form. I samband med hemförlossningar ombesörjer den barnmorska eller läkare som assisterat vid förlossningen att blanketten blir ifylld. På Stakes granskas uppgifterna, varvid bristfälliga eller misstänkt felaktiga uppgifter ytterligare kontrolleras. I födelseregistret saknas ungefär 1-2 % av de nyfödda. Av den orsaken kompletteras födelseregistret med data från Befolkningsregistercentralens uppgifter om levande födda och från Statistikcentralens uppgifter om dödfödda barn och barn som dött under den första levnadsveckan.

Termer:

Levande född: Nyfödd som oberoende av graviditetens längd efter födelsen andas eller uppvisar andra livstecken såsom att hjärtat slår, navelsträngen pulserar eller viljemässiga muskelrörelser oberoende av om moderkakan har lösgjort sig eller navelsträngen avskurits.

Spädbarnsdödlighet: Antalet dödsfall bland barn under ett år i relation till 1 000 levande födda.

Dödfödd: Foster eller nyfödd som vid födelsen inte uppvisar livstecken, och vars födelse överensstämmer med definitionen på en förlossning.


Perinatal dödlighet: Antalet dödfödda och antalet levande födda barn som avlidit under den första levnadsveckan (< 7 dygn) i relation till 1 000 födda barn.

Förlossning (ett nyfött barn): Händelse som leder till födelsen av ett foster eller barn vars gestationstid är minst 22 veckor ($\geq 22+0$ graviditetsveckor) eller barnets eller fostrets vikt är minst 500 gram (≥ 500 g). Inducerade aborter som med tillstånd av Rättskyddscentralen för hälsovården utförs under graviditetsveckorna 22-23 ($\leq 24+0$ graviditetsveckor) är inte förlossningar.

Parturients, births and newborn infants 2000– data supplier feedback 16/2001

Since 1987 STAKES and its predecessors have collected data on births. In 2000, the number of births was 56 473. The number has been declining from the mid-1990s. In 2000, it was 10 per cent lower than in 1995 and 1.6 per cent lower than the year before. Data collected by Statistics Finland for the first eight months of year 2001 suggest that the number of births will decrease by slightly 1.8 per cent during the present year. In Finland the total fertility rate has though long been on rather a high level (about 1.7) as compared with the European level.

Figure: Number of parturients 1987-2000



An increasing proportion of parturients are over 35 years of age. In 2000, the proportion was about 18 per cent of all parturients, while the corresponding figure in 1995 was 15 per cent. The proportion of parturients under 20 years of age has increased, being about 3 per cent of all parturients in 2000. In 2000, the average age of parturients was 29.9 years, and there has been no increase since 1998. The average age of primiparas has also remained on the same level since 1995, being 27.6 years in 2000. The prevalence of smoking during pregnancy has decreased from 16.5 per cent in the early 1990s to 14,0 per cent.

The number of multiple births has increased from 1.1 per cent in 1987 to 1.7 per cent in 1998, which is partly due to an increase in infertility treatments. In 2000, the proportion of multiple births was 1.6 per cent. One reason for this decrease is that fewer embryos than previously are transferred in fertility treatments.

The number of inpatient days for parturients has decreased. In 2000, 9,6 per cent of mothers stayed at the hospital at least two days before the birth and 3.6 per cent at least one week after the birth, while the corresponding figures were 12 per cent in 1991.

The proportion of Caesarean sections was about 14 per cent in the early 1990s as compared with 16 per cent in 2000. The use of epidural anesthesia for pain relief has constantly increased. In 2000, 38,3 per cent of parturients used this method of pain relief. The proportion of those that used at least one method of pain relief was 64 per cent in 1991 and 74 per cent in 2000. On the contrary, the use of episiotomy has decreased from 56 per cent in 1991 to 42 per cent in 2000.

The proportion of pre-term births (less than 37 completed weeks) or infants with a low birth weight (less than 2 500 g) has increased. In the early 1990s, the proportion of pre-term births was 5.6 per cent, as compared with 6.3 per cent in 2000. The proportion of births at low weight has increased from 4.0 per cent to 4.5 per cent.

In 2000 the perinatal mortality was at the same level than previous years. The rate of stillbirths and deaths during the first week of life was 5.7 per 1 000 births. In Finland, as well as in Norway, Sweden, Iceland and Japan, the mortality rate is among the lowest in the world.

Tables:

Table 1: Time series for Birth Register 1987-2000

Table 2: Parturients, births, perinatal deaths by hospital district 2000

Sources:

The Medical Birth Register contains, from 1987 onwards, data on all mothers given birth and on all children born in Finland. All live births and all stillbirths at a birth weight of at least 500 g or a gestational age of at least 22 weeks are included in the register. For each child, a form has to be filled in by the hospital no later than seven days after the delivery. This form is sent either in paper form or electronically to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES). As for births taking place at home, the form is to be filled in by the midwife or the physician who has assisted in the delivery. The data sent to STAKES will then be checked and the hospital will be contacted for any missing or supposedly incorrect information. Data for about 1–2 per cent of infants are missing in the Birth Register. The register is therefore completed by data compiled by the Central Population Register on live births and by data compiled by Statistics Finland on stillbirths and deaths during the first week of life.

Terms:

Live birth: Birth of a child that, irrespective of the duration of the pregnancy, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or movement of the voluntary muscles, whether or not the placenta is attached or the umbilical cord has been cut.

Infant mortality: Deaths during the first year of life per 1 000 live births.

Stillbirth: Birth of a foetus or a child that shows no evidence of life typical of a live birth, but complying with the definition of a birth.

Perinatal mortality: Stillbirths and deaths during the first week of life (< 7 days) per 1 000 births.

Birth: A process resulting in a foetus or a child of at least 22 weeks of gestation ($\geq 22+0$ weeks of gestation) or weighing at least 500 g (≥ 500 g) being born. An induced abortion performed during the 23rd or 24th week of pregnancy ($\leq 24+0$ weeks of gestation) by permission from the National Authority for Medicolegal Affairs is not regarded as a birth.

Taulu 1: Syntymärekkisterin trendejä 1987-2000

Tabell 1: Trender för födelseregistret 1987-2000

Table 1: Birth Register time series in 1987-2000

Syntyttäjät, synnytykset / Födorskor, förlossningar / Parturients, deliveries		1987	1990	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Syntyttäjä / Födorskor / Parturients	N	59578	65307	65269	62749	60432	58944	56502	57371	56473
Yleinen hedelmällisyysluku / Allmänna fruktsamhetstal / General fertility rate ¹	/1000	47,7	52,3	52,1	49,9	48,5	47,7	46,4	47,5	46,9
Monisikiöiset synnytykset / Flerbörd / Multiple births	N	679	781	811	912	970	945	986	949	896
/100000 syntyttäjä / föderskor / parturients	/100000	1140	1214	1243	1453	1605	1603	1745	1654	1587
kaksoiset / tvillingar / twins	N	669	768	783	884	947	929	971	932	887
/100000	/100000	1123	1176	1200	1409	1567	1576	1719	1625	1571
kolmoset jne / trilling osv / triplet etc	N	10	25	28	28	23	16	15	17	9
/100000	/100000	17	38	43	45	38	27	27	30	16
Ennenaikaisia synnytyksiä (< 37 rvko) / Prematura förlossningar (<37 veckor) / Premature births (<37 gw)	%	5,2	4,9	4,9	5,1	5,3	5,1	5,3	5,5	5,6
IVF-synnytyksiä / förlossningar / births ²	N	203	761	1121	1196	1218	1192	..
/1000	/1000	3,1	12,1	18,5	20,3	21,6	20,8	..
IVF-lapsia / barn / children ²	N	253	958	1374	1473	1484	1451	..
/1000	/1000	3,8	15,0	22,4	24,6	25,8	24,9	..
Keski-ikä, kaikki / Medelåldern, alla / Mean age, all		28,9	29,1	29,1	29,7	29,7	29,8	29,9	29,9	29,9
ensisyntyttäjät / förstfödorskor / primiparas		26,5	26,8	26,9	27,6	27,6	27,7	27,7	27,6	27,6
Alle 20 v. / Under 20 år / Under 20 years	%	3,2	2,8	2,7	2,5	2,6	2,4	2,6	2,8	2,9
Yli 35 v. / Över 35 år / Over 35 years	%	13,3	13,9	13,6	15,1	15,9	16,7	17,5	18,1	18,4
Naimisissa / Giffta / Married	%	79,8	73,8	71,6	66,2	63,3	62,2	61,4	59,1	⁴⁾ 56,7
Avolitossa / Samboende / Cohabiting	%	12,3	18,0	21,3	21,6	23,2	26,0	27,2	28,2	⁴⁾ 29,1
Muut / Andra / Others	%	5,9	6,8	5,4	10,9	11,8	10,2	10,0	10,0	⁴⁾ 11,5
Ei tietoa / Ingen uppgift / No informatior	%	2,1	1,4	1,7	1,3	1,7	1,6	1,4	2,7	⁴⁾ 2,8
Aiempiä raskauksia / Tidigare graviditeter / Previous pregnancies	0	%	30,2	30,0	30,8	30,0	30,2	30,5	30,6	30,9
	3+	%	16,9	18,2	18,1	19,3	19,5	19,9	19,9	19,8
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlossningar / Previous deliveries	0	%	39,7	39,1	40,4	38,7	39,3	39,9	40,2	40,4
	3+	%	7,9	8,4	8,4	9,5	9,4	9,5	9,8	9,8
Aiempi / Tidigare / Previous										
keskenmeno / missfall / miscarriage	%	16,8	17,9	18,7	19,6	19,3	19,7	19,8	19,9	20,0
keskeytys / abort / induced abortion	%	14,5	12,5	12,5	12,5	12,6	12,4
kohdunulkoinen raskaus / extrauterin graviditet / extrauterine pregnancy	%	1,7	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0
Tupakoineita / Rökare / Smokers	%	14,9	15,5	16,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,2	14,0
Tarkastuskäynnejä yhteensä / Kontrollbesök totalt / Antenatal visits total	N, x	15,2	15,0	15,1	16,0	16,4	16,5	16,6	16,7	16,9
1. käynnin ajankohta / 1. besöket tidpunkt / Timing of the first visit (rvko / veckor / gw)		10,1	9,8	9,8	9,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,7
Poliklinikakäynnejä / Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik / Visits to outpatient clinic	N, x	..	2,3	2,2	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
Sairaalahoito / Sjukhusvård / Hospitalization										
raskauden aikana / under graviditet / during preg.	%	19,2	20,6	20,5	21,2	20,8	22,4	20,7
synnytyksen yhteydessä / förlossning / birth:										
> 2 pv ennen / dagar före / days before	%	12,1	10,9	10,8	10,7	10,4	10,4	9,6
> 7 pv jälkeen / dagar efter / days after	%	12,1	5,7	5,5	5,3	4,6	4,1	3,6
Kivunlievitys / Smärtlindrande / Pain relief										
epiduraali / epidural anesthesia ³	%	8,2	11,4	14,5	22,1	28,5	26,3	31,2	34,9	38,3
paraservikaali / paracervical anesthesia	%	12,0	13,7	16,5	21,2	18,5	20,2	19,8	20,1	19,2
pudendaali / pudendal	%	0,2	0,3	0,3	0,9	1,1 ⁴⁾	0,8	1,0	1,1	1,7
ilokaasu / lustgas / nitrous oxide	%	40,4	46,0	38,2	40,5	44,9	44,8	44,6
muu puud tai lääkitys / annan / other	%	17,9	26,0	21,2	22,1	25,9	25,1	25,8
vähintään jokin / åtminstone någon / at least some	%	62,5	70,5	71,2	71,0	72,5	73,3	74,4

.. Tietoa ei ole kerätty tai se on liian epävarma esitettäväksi. / Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges. .

Data not available or too uncertain for presentation.

¹⁾ Elävänä syntyneiden määrä tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohti. / Antalet levande födda per 1000 kvinnor i åldern 15-49 år.

The number of annual live births per 1,000 women aged 15 to 49 years.

²⁾ Stakes: IVF-filasto. Stakes: IVF-statistik. STAKES: IVF statistics.

³⁾ Pl. keisarileikkaukset. - Ekskl. kejsarsnitt. - Excl. sections.

⁴⁾ Pl. Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS). - Ekskl. Tammerfors universitetssjukhus. - Excl. TAYS.

Syntyttäjät, synnytykset / Föderskor, förlossningar / Parturients, deliveries		1987	1990	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Keisarileikkaukset / Kejsarsnitt / Sections	%	14,4	13,8	14,3	15,7	15,7	15,6	15,5	15,8	15,8
- suunniteltu / planerad / planned	%	7,0	7,8	7,8	7,6	7,3	7,4	7,2
- muu keisarileikkaus / annan kejsarsnitt / other section	%	7,3	7,9	7,9	8,1	8,1	8,4	8,7
Imukuppi / Vakuumextr. / Vacuum extract.	%	3,5	3,2	4,8	5,0	5,1	5,3	5,1	5,6	5,9
Perätilan ulosautto ja -veto / Uthämtning av säteläge/-extraktion / Breech presentation/-extraction	%	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6
Pihtisyntytyt / Tångförlossning / Forceps	%	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Sikiön elektr.valv. / Elektronisk fosteröverb. / EFM	%	53,2	..	72,0	82,8	80,1	84,9	86,2	86,6	84,8
Kalvojen puhkaisu / Amniotomi / Amniotomy	%	45,1	45,6	43,9	44,8	44,7	44,7	44,0
Oksitosiini / Oxytocin	%	35,3	36,3	36,1	38,8	40,5	41,3	41,2
Episiotomia / Episiotomi / Episiotomy ⁶	%	56,3	47,2	42,4	42,2	41,7	42,7	41,8
Prostaglandiini / Prostaglandin	%	5,3	7,6	9,5	7,6	7,5	7,2	5,9
Sikiöveren pH / pH i fosterblod / pH, foetal blood	%	5,6	2,9	3,1	3,6	4,4	5,1	6,8
Käynnisty / Igångsättning / Induced labour	%	16,1	13,9	13,0	14,1	18,7	14,6	15,1	15,2	14,2

Syntyneet lapset		1987	1990	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Nyfödda barn / Newborn children										
Syntyneitä, yht/ Födda, total / Newborns, total	N	60254	66124	66114	63687	61423	59904	57498	58333	57398
Elävänä syntyneet / Levande födda / Live born	N	59927	65808	65792	63385	61180	59662	57260	58127	57170
Kuolleena syntyneet / Dödfödda / Stillbirths	N	327	316	322	302	243	242	238	206	228
/1000 synt.		5,4	4,8	4,9	4,7	4,0	4,0	4,1	3,5	4,0
Kuollut alle 7 vrk ikäisenä / döda före 7 dygn	N	200	202	224	136	138	133	135	121	98
/1000 synt.		3,3	3,1	3,4	2,1	2,2	2,2	2,3	2,1	1,7
Perinataalikuolleisuus / Perinataldödlighet / Perinatal mortality ⁶	/1000 synt.	8,7	7,8	8,3	6,9	6,2	6,3	6,5	5,6	5,7
Imeväiskuilleisuus / Spädbarnsdödlighet / Infant mortality ⁷	/1000 eläv.synt.	6,2	5,6	5,9	4,0	3,9	3,9	4,2	3,6	..
Ennenaik. syntyneitä (< 37 rask.viikkoa)/ Gestationslängd < 37 veckor / Gestational age (<37 w)	N	3346	3565	3560	3615	3695	3413	3395	3569	3607
%		5,6	5,4	5,4	5,7	6,0	5,7	5,9	6,1	6,3
Keskipaino / Medelvikt / Mean weight	g / gr	3547	3552	3548	3538	3521	3519	3516	3509	3515
Paino / Vikt / Weight										
< 2500 g / gr	N	2349	2576	2622	2695	2676	2503	2522	2660	2601
%		3,9	3,9	4,0	4,2	4,4	4,2	4,4	4,6	4,5
< 1500 g / gr	N	557	548	606	590	572	552	503	552	540
%		0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
< 1000 g / gr	N	277	273	308	295	276	259	256	272	239
%		0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Lasten hoitotoimenpiteitä / Åtgärder för nyfödda Interventions to newborns										
Antibioottihoito / Antibiotikabehandling / Antibiotics	%	2,3	2,8	2,7	2,9	3,5	3,7	3,7
Valohoito / Ljusbehandling / Phototherapy	%	4,4	5,9	5,5	5,7	6,2	6,5	6,1
Verenvaihto / Blodbyte / Exchange transfusion	%	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Intubaatio / Intubation	%	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	0,6
Respiraattori / Respiratorbehandling / Respirator care	%	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Teho-osasto / Intensivavd. / Intensive care ward	%	3,5	4,4	3,3	3,8	5,0	5,2	5,0
Valvontaos. / Observationsavd. / Observation ward	%	4,2	5,1	5,1	4,8	5,7	6,2	6,1
Lapsi kotona viikon iässä / Barnet hemma i en veckas ålder / Child at home at the age of one week	%	75,7	82,7	85,7	91,0	90,3	91,3	91,5	90,7	91,3

⁵⁾ Pl. keisarileikkaukset. - Ekskl. kejsarsnitt. - Excl. sections.

⁶⁾ Kuolleena syntyneet ja alle 7 vrk iässä kuolleet tuhatta syntyneitä kohti. / Dödfödda och döda före 7 dagar per 1000 födda. / Stillborns and died before 7 days per 1,000 newborns.

⁷⁾ Alle vuoden ikäisenä kuolleet (pl. kuolleena syntyneet) tuhatta elävänä syntyneitä kohti. / Döda före ett års ålder (exkl. dödfödda) per 1000 levande födda. / Died before age of one year (stillborns excluded) per 1,000 live borns.

Lähde - Källa - Source : Tilastokeskus. Statistikcentralen. Statistics Finland.

Taulu 2: Synnyttäjät, syntyneet lapset, perinataalikuolleet sairaanhoitopiireittäin 2000

Tabell 2: Föderskor, födda barn, perinataldöda enligt sjukvårdsdistrikt 2000

Table 2: Parturients, births, perinatal deaths by hospital district 2000

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Synnyttäjät - Föderskor - Parturients		Syntyneet lapset - Födda barn - Newborns		
	Yhteensä Totalt Total	Ikä Ålder Age 15-49 /1000 ⁽²⁾	Elävänä syntyneet Levande födda Live births	Kuolleena syntyneet Dödfödda Stillbirths	Perinataalikuolleet Perinataldöda Perinatal deaths /1000 ⁽³⁾
Helsingin ja					
Helsingfors och	6 247	41,1	6 359	23	38 6,0
Uudenmaan -					
Nylands	10 533	50,9	10 670	34	50 4,7
Varsinais-Suomen -					
Egentliga Finlands	4 752	44,6	4 826	17	21 4,3
Satakunnan -					
Satakunta	2 191	43,0	2 223	7	9 4,0
Kanta-Hämeen -					
Centrala Tavastlands	1 706	46,3	1 728	5	10 5,8
Pirkanmaan -					
Birkalands	4 789	45,6	4 832	18	31 6,4
Päijät-Hämeen -					
Päijänne-Tavastland	2 074	44,4	2 091	11	19 9,0
Kymenlaakson -					
Kymmenedalens	1 674	42,1	1 693	7	7 4,1
Etelä-Karjalan -					
Södra Karelen	1 175	41,6	1 191	1	1 0,8
Etelä-Savon -					
Södra Savolax	928	40,3	951	2	3 3,1
Itä-Savon -					
Östra Savolax	515	36,9	515	4	4 7,7
Pohjois-Karjalan -					
Norra Karelen	1 604	41,8	1 628	7	9 5,5
Pohjois-Savon -					
Norra Savolax	2 525	44,0	2 546	15	21 8,2
Keski-Suomen -					
Mellersta Finlands	2 726	45,3	2 756	21	24 8,6
Etelä-Pohjanmaan -					
Syd-Österbottens	2 054	48,1	2 075	8	11 5,3
Vaasan -					
Vasa	1 822	49,6	1 837	9	11 6,0
Keski-Pohjanmaan -					
Mellersta Österbottens	867	49,7	875	3	6 6,8
Pohjois-Pohjanmaan -					
Norra Österbottens	4 978	57,2	5 025	23	30 5,9
Kainuun -					
Kajanalands	771	40,6	782	5	7 8,9
Länsi-Pohjan -					
Västra Österbottens	748	48,0	753	3	5 6,6
Lapin -					
Lapplands	1 236	43,6	1 251	3	6 4,8
Ahvenanmaan maakunta -					
Landskapet Åland	255	43,1	259	1	2 7,7
Koko maa -					
Hela landet - Whole country	56 473	46,3	57 170	228	326 5,7

¹⁾ Synnyttäjän asuinkunnan mukaan - Enligt hemkommun - According to domicile

²⁾ Tuhatta naista kohti - Per 1000 kvinnor - Per 1,000 women

³⁾ Kuolleena syntyneet ja alle 7 vrk iässä kuolleet tuhatta syntynyttä kohti - Dödfödda och döda under 7 dagar per 1000 födda - Stillbirths and deaths before 7 days per 1,000 births